

¿Qué opinan los pacientes VIH del cambio de tratamiento a monoterapia con IPs?



Pau Riera Armengol

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)


*Jornadas 2014 de Atención Farmacéutica
al Paciente con Patologías Víricas*



GHEVI
Grupo de Hepatopatías
Víricas de la SEFH

¿Qué veremos?

- Introducción: condiciones de monoterapia en el Hospital de Sant Pau
- Proyecto: *¿cuál es la opinión de los pacientes?*
- Conclusiones



Monoterapia con IP

¿Qué se hace en Sant Pau?

- Criterios de monoterapia:
 - CV < 50 copias/ml los 6 meses anteriores.
 - CD4 > 200 células/ml los 6 meses anteriores.
 - CD4 nadir > 50-100 células/ml.
 - Sin fallo virológico con IP.
 - Sin evidencia de resistencias a IP.
 - No coinfección VHB.
 - Buena adherencia.



¿Por qué nos planteamos este proyecto?



Proyecto

Monoterapia en los pacientes VIH: ¿qué opinan?

Objetivos

- Determinar el grado de satisfacción con la monoterapia.
- Comprobar si la monoterapia facilita la adherencia al tratamiento antirretroviral.
- Determinar si la monoterapia reduce los efectos adversos que presentan los pacientes.

Criterios de inclusión

Pacientes VIH del HSCSP mayores de 18 años que lleven **por lo menos 6 meses de tratamiento con monoterapia** (inicio de tratamiento antes del 1 de enero de 2014).


Cuestionario

¿Crees que estar en tratamiento con monoterapia te facilita el buen cumplimiento del tratamiento farmacológico?

- Sí, me facilita la adherencia.
- No, no afecta la adherencia al tratamiento.


n = 11

bid



n = 74


qd




¿Desde que estás en tratamiento con monoterapia crees que tienes menos efectos adversos?

- Sí.
- No, tengo igual que antes.
- No, tengo más que antes.

n = 11




n = 74




¿El hecho de estar tratado con monoterapia te hace tener la sensación de estar peor tratado?

- Sí, creía que era mejor el tratamiento previo con tres fármacos.
- No, creo que el tratamiento actual es igual de bueno.

n = 11




n = 74




¿Estás más satisfecho con tu plan terapéutico desde que realizas el tratamiento con monoterapia?

- Sí.
- No.
- Igual que antes.


n = 11



n = 74



Conclusiones



- Los pacientes con monoterapia reciben darunavir/ritonavir o lopinavir/ritonavir.

Opinión de los pacientes:

- Facilita la adherencia al tratamiento ARV.
- Opción mejor tolerada que la triple terapia (ITIAN + IP)
- Mayor satisfacción. No tienen la impresión de estar peor tratados.