



SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE APREPITANT

Mejuto Pérez del Molino, B, Fernández López de Vicuña, E.M, Durán Román, C, Carbajales Álvarez, M, Rodríguez Nebreda, S.

Hospital de Cabueñes (Gijón)

Objetivo

- ✓ Valorar el perfil de **efectividad y seguridad** de aprepitant en pacientes a tratamiento con regímenes de quimioterapia (QT):
 - Altamente emetógena
 - Moderadamente emetógena
 - Pacientes refractarios a su pauta antiemética inicial
-

Material y métodos

- ✓ Estudio prospectivo, descriptivo y observacional
- ✓ Duración: 6 meses (de octubre de 2007 a marzo de 2008)
- ✓ Primer ciclo: dispensación + información oral y escrita

| MEDIDAS PARA ALIVIAR LAS NÁUSEAS Y VÓMITOS PRODUCIDOS POR SU TRATAMIENTO | | NÁUSEAS Y VÓMITOS |
|---|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">-Reposar sentado o incorporado después de las comidas.-Tomar los alimentos fríos o a temperatura ambiente para disminuir el sabor.-Comer despacio masticando bien los alimentos.-Beber líquido a sorbos pequeños fuera de las horas de comida.-Fraccionar la dieta en varias y pequeñas tomas. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">APREPITANT (Emend®)</div>  |
|  | <ul style="list-style-type: none">-Evitar comer o beber las 2 horas previas de recibir el tratamiento de quimioterapia.-Evitar alimentos fritos, grasos, con mucho sabor o aroma intenso.-Evitar bebidas con gas, café y té. | Nombre del paciente: <input type="text"/> |
| Servicio de Farmacia Hospital de Cabueñes Tlf'n : 985850018 (Extensión 85382) | | |

- ✓ Ciclos posteriores: dispensación + encuesta

Material y métodos

✓ Datos obtenidos en la encuesta:

- Número de historia
 - Nombre y apellidos
 - Fecha de inicio de tratamiento
 - Esquema de QT que recibe
 - Presencia/ausencia de náuseas y/o vómitos
 - Si/No refractario a otro tratamiento antiemético
 - Efectos adversos
-

Material y métodos

- ✓ **Variable de efectividad**

Respuesta completa (ausencia de episodios eméticos sin uso de tratamiento de rescate en los días 1 a 5 posteriores al ciclo de QT)


- ✓ **Variable de seguridad**

Efectos adversos comunicados por el paciente en la encuesta

Resultados


- ✓ Total pacientes incluidos en el estudio: 86

Distribución de pacientes por régimen de QT recibido




Resultados

- ✓ Total pacientes encuestados: 83
- ✓ Total de pacientes con respuesta completa: 64 (77,2%)



Resultados

- ✓ Total pacientes con efectos adversos: 7 (8,4%)
- ✓ Total efectos adversos: 11



Conclusiones

1. La respuesta es completa en la mayoría de los pacientes a tratamiento con QT **altamente emetógena**.
 3. Gran parte de los pacientes a tratamiento con QT **moderadamente emetógena** refirieron náuseas y/o vómitos aún con el antiemético a estudio.
-

Conclusiones

3. En los pacientes **refractarios** a otros antieméticos el resultado ha sido satisfactorio en un elevado porcentaje de los casos.
 4. Los **efectos secundarios** del fármaco encontrados están descritos en ficha técnica y no han supuesto un problema mayor.
-



Gracias por su atención
