

Grupo de Hepatopatías Víricas (GHEVI)

Mercè Ardèvol Aragonès
Hospital Germans Trias i Pujol
Badalona

53 Congreso Nacional de la SEFH. Valencia 21 al 24 de octubre

Objetivos del grupo GHEVI

- Facilitar la actividad asistencial, docente y de investigación que desarrollan los Farmacéuticos de Hospitales en el ámbito de la Atención Farmacéutica al paciente con VHC y VHB

Porqué los objetivos del grupo GHEVI

Tratamiento VHC con IFN y RBV

- Debido a los efectos adversos, los abandonos del tratamiento son altos (15-20%) ¹
- La atención especializada (equipo multidisciplinar), los sistemas de soporte y control de EA facilitan el cumplimiento²
- El cumplimiento terapéutico aumenta los resultados de la RVS³

1. Fried NEJM 2002. Hadziyannis AofIM.2004


2. Solà et al Gastroenterol Hepatol 2004

3. MC Hutchison JG; Gastroenterology 2002

Efecto del cumplimiento terapéutico* sobre la respuesta víral sostenida

Estudio en 2.804 pacientes con HCC tratados desde 2001 al 2005

* (>80% de la dosis y el tiempo prescrito)



Que hemos hecho ?

Jornadas anuales actualización hepatopatías víricas

- **2006**
- **2007 (Madrid y Barcelona)**
- **2008 (Barcelona)**


Proyecto IRYS

Programa de intervención regulada en el tratamiento de la hepatitis crónica C con Pegasys[®] y ribavirina en el ámbito de la Farmacia Hospitalaria

Proyecto IRYS. Objetivos

- **Primario:**
 - Evaluar el impacto del programa de intervención regulada sobre la tasa de respuesta viral sostenida en un grupo de pacientes que inician tratamiento con Pegasys[®] y ribavirina
- **Secundarios:**
 - Evaluar el impacto del programa de intervención regulada sobre la permanencia del tratamiento con Pegasys[®] y ribavirina en un grupo de pacientes que inician tratamiento.
 - Evaluar la percepción que el paciente tiene de la labor que lleva a cabo el farmacéutico y su equipo asistencial antes y después del programa
- **Publicar** los datos en foros y revistas de interés farmacéutico

Estudio IRYS



* 51 Congreso de la SEFH 2007: abstract 1226



AVANCE DE RESULTADOS ANÁLISIS ESTADÍSTICO IRYS

Febrero 2008

365 casos "A"



119 casos "B"

Datos facilitados por: EPISTÉME (HealthCare)

Sexo- Edad-Tiempo de evolución


- Sexo del paciente:
 - Hombres: 62%
 - Mujeres: 37%
 - No contesta: 1%
- Edad media del paciente: 45 años (Mediana 44,5 años)
- Tiempo desde diagnóstico enfermedad: 6,9 años (Mediana 4 años)

Cómo se siente con su enfermedad




Principales dudas sobre su enfermedad



A




B




Principales dudas sobre el tratamiento que va a recibir




Situaciones con las que más identificado se siente. A




PRINCIPALES NECESIDADES. A




Qué espera del servicio de Farmacia. A



Principales necesidades cubiertas. B



Qué ha conseguido del servicio de Farmacia. B



Pacientes reclutados y con final de tratamiento (junio/08) n=213

Datos demográficos

Edad (años) (DE)	45,9 (9,89)
Sexo (hombre)	59%
Años infectado por VHC (DE)	19,3 (11,98)
Años desde el diagnóstico (DE)	7,5

Pacientes reclutados y con final de tratamiento (junio/08) n=213

Datos de virología y cirrosis

Genotipo 1	64,2%
Genotipo 2	2,9%
Genotipo 3	22,9%
Genotipo 4	10,0%
Cirrosis	3,7%

Pacientes reclutados y con final de tratamiento (junio/08) n=213

Abandonos y pérdida seguimiento

Abandonos voluntario	2,3%
Pérdida de seguimiento	3,7%

Conclusiones

- El manejo de los pacientes con HC es complejo y desafiante
- La atención multidisciplinaria supone por lógica y una mejora en la atención de estos pacientes
- Los modelos, y resultados no son fácilmente extrapolables ni es fácil identificar elementos o figuras clave (IRYS?)
- En base a las encuestas realizadas la necesidad de información al paciente es elevada y la satisfacción del mismo con el SF es muy favorable

Estudio pendiente de inicio

- Evaluación de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud durante el tratamiento combinado de la Hepatitis Crónica por el virus de la Hepatitis C en condiciones de práctica clínica habitual

Objetivo principal

- Evaluar el impacto de la HCC y su tratamiento con peg-IFN alfa-2b y RBV en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de una cohorte de pacientes a lo largo de 72 semanas de seguimiento

Objetivos previstos

- Jornadas actualización hepatopatías año 2009
- Proyectos en estudio VHB
 - Tratamiento del VHB
 - Información al paciente sobre VHB

