


grupos de trabajo de la SEFH:

GEDEFO

- FUNDACION GEDF**
GRUPO ESPAÑOL PARA EL DESARROLLO DE LA FARMACIA ONCOLÓGICA



- 7 Consejos Territoriales
 - Planifica sus propias actividades
 - Se coordina con resto de zonas
 - Presidente territorial → Consejo Director GEDEFO

Consejo director

- Presidente: Gerardo Cajaraville
- Vicepresidente: Ana Clopés
- Secretaria: Sefa Carreras
- Irene Manges
- Ana Cris Cercós
- Begoña Muros
- Carmen Martínez
- Paula de Juan
- María Jesús Lamas → Sonia González Costas

- **FINES:**


- + **formación**

- + **desarrollo** de la farmacia oncológica →
integración en el equipo asistencial → mejorar
la atención al paciente

- + colaboración entre farmacéuticos de hospital
de onco-hematología.

- + proyectos **investigación** cooperativos

FINES



PROYECTOS NACIONALES 2008

- Curso certificación BPS
- Manipulación de citostáticos
- Citostáticos orales
 - documento consenso
 - información al paciente
- Estudio Metástasis óseas y bifosfonatos:
- Análisis farmacoeconómico nuevos fármacos

1. Becas BPS.....BCOP

Objetivo general


- asegurar que la población reciba una atención farmacéutica competente

Responsabilidades principales

- reconocer especializaciones
- establecer estándares certificación y recertificación
- evaluar objetivamente

Board of Pharmaceutical Specialties

bps



www.bpsweb.org

No es un título, no es un curso, es un certificado

1. Becas BPS.....BCOP

FUNDACION
GEDEFO
GRUPO ESPAÑOL PARA EL DESARROLLO DE LA FARMACIA ONCOLÓGICA

Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria

**Ofertan
la IV Convocatoria de:**

20 Becas

para la preparación
de la obtención del diploma como
Especialista en Farmacia Oncológica
otorgado por BPS
(Board of Pharmaceutical Specialties)

Dra. del curso: Dra. M^a Josep Carreras
Servicio de Farmacia
Hospital Vall d'Hebron
Barcelona

Con la colaboración de la **San**

- examen,
- Material docente (ASHP y ACCP)
- tutoría y preparación.
- Gastos notariales (traducción jurada)
- Traslados y estancias
- Acreditación MS (en trámite) (actual 9,9 créditos)

Board of Pharmaceutical Specialties

bps

- Qué nos aporta a nosotros...
 - Orientación clínica
 - Reconocimiento por oncólogos
 - Recertificación continua o cada 7 años

Formación + Desarrollo profesional

...un antes y un después...

1. BPS

- +55 BCOPs españoles
- 5^a promoción 2008-2009
 - 50 aspirantes → 20 seleccionados examen oncología + inglés

2. Manipulación citostáticos

- Zona Catalano-Balear
 - Encuesta
 - Reunión INST, Societat Catalana de Farmàcia Clínica, Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball → contaminación ambiental, viales.
 - <http://www.academia.cat/societats/farmcl/formacio/sessions/any0708/>
 - PNTs
 - Carta Farmaindustria, Administraciones. [en proceso](#)
- Zona Valencia-Levante
 - PNTs y Póster derrames
 - PNTs y Póster manipulación citos orales
 - <http://gedefo.sefh.es/> pendiente

3. Citostáticos orales

- Zona Noroeste
 - Documento de consenso posicionamiento profesional.
 - Aprobado en todas las zonas GEDEFO
 - Firma más de 200 farmacéuticos

3. Citostáticos orales: documento consenso

- Mayoría DH → regulación por Comunidad
- Son citotóxicos y orales → problemas:
 - Manipulación
 - Adherencia
 - Margen terapéutico estrecho
- Plan terapéutico complejo (RT/QT/CIR)
 - Especialista oncológico
 - Ambiente multidisciplinar
- Farmacéutico del equipo multidisciplinar
 - Atención individualizada
 - Adherencia, protocolo, valoración polifarmacia
 - Adecuar recursos

3. Citostáticos orales: documento...

- Presentado SEOM y AEHH
 - Conformidad presidentes
 - Pendiente Juntas Gobierno → apoyo pendiente
- Colgar <http://gedefo.sefh.es/> pendiente
- Difusión profesional, administración

3. Citostáticos orales

- Zona catalano-balear
 - Trípticos información a paciente
 - 14 hospitales, 20 farmacéuticos
 - 31 trípticos castellano y catalán
 - Colgar <http://gedefo.sefh.es/> pendiente
 - auspicio SEOM pendiente



CONSERVACIÓ		RECOMANACIONS AL PACIENT		INFORMACIÓ DE MEDICAMENTS																													
Mantenir les càpsules en el seu embol original a temperatura ambient, protegides de la llum i de la humitat.		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Efecte</th> <th colspan="3">Dose</th> <th rowspan="2">Efecte</th> </tr> <tr> <th>20 mg</th> <th>50 mg</th> <th>70 mg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> Notes:		Efecte	Dose			Efecte	20 mg	50 mg	70 mg																					SPRYCEL 20 mg comprimets recoberts amb pel·lícula blava SPRYCEL 50 mg comprimets recoberts amb pel·lícula blava SPRYCEL 70 mg comprimets recoberts amb pel·lícula blava	
Efecte	Dose				Efecte																												
	20 mg	50 mg	70 mg																														
CADUCITAT No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'embol.		En cas de dubte contacta amb el teu metge o farmacèutic		DA-SATINIB sprycel® Comprimets 20, 50 y 70 mg																													
ADVERTÈNCIES Mantenir els medicaments fora de l'abast dels nens. Aquest medicament sols es pot aconseguir a través del Servei de Farmàcia de l'Hospital, amb la recepta que li farà el seu metge d'aquest Centre. Retornar la medicació sobrants a la Farmàcia de l'Hospital. Dispondrà les instruccions del medicament a l'embolatge en el punt SIGRE de la farmàcia més propera o a la Farmàcia de l'Hospital. Les dones embarassades hauran de tenir especial cura d'evitar el contacte amb el contingut dels comprimets.		COM CONTACTAR Tel·lèfon Farmàcia Oncològica		EFFECTES ADVERSSOS Els efectes adversos més freqüents que no signifiquen que apareguin a tots els pacients són: - Dolors, mialgies. - Infeccions: febre, calfreds o qualsevol símptoma d'infecció. - Dificultat cutània, pruritis. - Dificultat al respirar, tos. - Pot augmentar el risc d'hematomes, hemorràgies, igualment amb els utensilis que utilitzem. - Mal de cap, mareig. - Augment o disminució del pes, feigesa. - Dolor muscular. Comentari amb el seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos o qualsevol altre que origini relació amb la medicació. Així mateix, informi al seu metge si: - Presenta una reacció al·lèrgica greu (envermelliment de la pell, dificultat al respirar...). - Dolor toràcic. - Tarda alguna d'infecció com febre, calfreds, tos, símptomes gripals... - Sagnats, és hematomes importants, i s'observa sang en vòmits o orina. - En cas de sobredosi.																													

4. Estudio Metástasis Oseas y Bifosfonatos

- Zona Noroeste → extensible resto España
- Observacional retrospectivo. Período de observación 1 año. 250 pacientes
- Objetivo
 - Conocer perfil utilización bifosfonatos
 - Conocer efectos adversos situación real
 - Comparar con Guía Consenso Annals of Oncology¹⁹: 420–432, 2008

<http://gedefo.sefh.es/>

¡Gracias!