

# EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD A LARGO DE PLAZO DE ETARNECEPT Y ADALIMUMAB EN EL TRATAMIENTO DE LA ARTRITIS REUMATOIDE

López Sandomingo L, Domínguez Urbistondo G, Rodríguez Penín I, Salazar Laya B, Rodríguez González AM, Fuster Sanjurjo L

Servicio de Farmacia. Hospital Arquitecto Marcide. Área Sanitaria de Ferrol

## OBJETIVO:

Evaluar la efectividad a largo plazo de etanercept y adalimumab en el tratamiento de la artritis reumatoide (AR) e identificar factores predictores de respuesta.

**MATERIAL Y MÉTODOS:** Pacientes diagnosticados de AR a tratamiento con etanercept o adalimumab durante más de 2 años.

### DATOS REGISTRADOS

1. Datos demográficos.
2. Información sobre la enfermedad (presencia de factor reumatoide positivo).
3. Datos relativos al tratamiento (dosis, duración del tratamiento, terapia concomitante).
4. Medidas de efectividad (DAS28, PCR, VSG, HAQ y valoración global subjetiva).

### ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN

↓  
DAS  
al final del período de estudio  
↓  
< ó > 2,6  
(valor de remisión clínica)

### SE EVALUARON FACTORES PREDICTORES DE RESPUESTA

- Edad
- Sexo
- Presencia de factor reumatoide positivo
- Duración de la enfermedad
- Tipo de anti-TNF
- Tratamiento concomitante
- Actividad de la enfermedad al inicio del tratamiento.

### FUENTES DE DATOS

- Hoja seguimiento Servicio de Farmacia.
- Informe Servicio de Reumatología.
- Programa dispensación a pacientes externos, Dipex®
- Base de datos del Laboratorio.

**RESULTADOS:** Se incluyeron 38 pacientes con una edad media de 53,5 (34-71) años (81,6%) mujeres

33 pacientes factor reumatoide positivo	33 pacientes valorables
Tiempo desde diagnóstico hasta comienzo Anti-TNF 133(8-408) meses	28 pacientes valorables

MEDIA DE DURACIÓN DE TTO CON ANTI-TNF 48,6 (24-72) MESES

### TRATAMIENTO RECIBIDO

65,8% ETARNECEPT	5,3% CAMBIÓ DE ETARNECEPT A ADALIMUMAB
18,4% ADALIMUMAB	10,5% CAMBIÓ DE ADALIMUMAB A ETARNECEPT

### TRATAMIENTO CONCOMITANTE

17 PACIENTES FAME

20 PACIENTES CORTICOIDES

8 pacientes etanercept

1 paciente adalimumab

DAS28: 3,44 (30)

DAS < 2,6: 9 PACIENTES

HAQ: 1,7 (33)

VALORES MEDIOS (pacientes valorables)

PCR: 15,1 (33)

VSG: 26,2 (31)

**Valoración global subjetiva:**  
buen control de la enfermedad en 24 pacientes (33 pacientes valorables)

No se observaron diferencias en edad, sexo, factor reumatoide, duración enfermedad y tratamiento concomitante

No se pudo evaluar DAS inicial por no existir registro en la historia clínica e iniciar el tratamiento antes de implantar el protocolo que contempla el registro de la actividad de la enfermedad al inicio de la terapia

## CONCLUSIONES

- El tratamiento con etanercept o adalimumab muestra un control moderado de la enfermedad a largo plazo
- No se han podido identificar factores predictores de respuesta en la población estudiada.
- Se observa un deficiente cumplimiento de los criterios de seguimiento del tratamiento de la artritis reumatoide que establecen el envío de informes periódicos al Servicio de Farmacia con medidas objetivas de actividad de la enfermedad.