



REVISIÓN DE LA UTILIZACIÓN POR USO COMPASIVO DE MICOFENOLATO DE MOFETILO EN EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO MANCHA-CENTRO

Márquez Nieves, J.J.; Conde García, MC; Sánchez Ruiz, M; Heredia Benito, M;
Fraga Fuentes, D; Valenzuela Gámez, J.C.
S. de Farmacia. CH "La Mancha-Centro". Alcázar de San Juan. Ciudad Real

INTRODUCCIÓN

El micofenolato de mofetilo (MMF) es un inmunosupresor que está indicado para la profilaxis del rechazo agudo de trasplante renal, cardíaco o hepático, pero que en determinadas situaciones se emplea por uso compasivo para prevenir el rechazo en otros tipos de trasplantes o para el tratamiento de ciertas enfermedades autoinmunes.

OBJETIVOS


Describir las condiciones de uso de micofenolato de mofetilo por parte del Servicio de Oftalmología de un hospital general de 250 camas cuando se emplea para indicaciones no aprobadas en ficha técnica y evaluar la eficacia y seguridad de dicho fármaco en estos casos.

METODOLOGÍA

Se trata de un estudio observacional y retrospectivo de todos los pacientes tratados con MMF para cualquier indicación en el Servicio de Oftalmología. Los pacientes se han localizado a través de la base de datos de pacientes externos y de los impresos de solicitud de uso compasivo y, para evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento, se han revisado las correspondientes historias clínicas.

RESULTADOS

A lo largo de 5 años se ha solicitado el uso compasivo y han sido tratados 11 pacientes con los siguientes diagnósticos:



Todos los pacientes han recibido 1g/12h de MMF y la duración media del tratamiento ha sido de 19,8 meses (sin tener en cuenta a 3 pacientes que aún continúan con el tratamiento). En relación a la medicación concomitante, destacar que 4 pacientes recibieron además tratamiento con ciclosporina y 2 de ellos con ciclofosfamida. Con respecto a la eficacia, hay 3 pacientes que permanecen estables, tras una media de 20,6 meses desde el comienzo del tratamiento, mientras que 7 de ellos han progresado a los 12 meses como valor medio, presentando además 3 de ellos en la actualidad ceguera legal en uno o ambos ojos. El paciente restante recibió tratamiento durante 5 meses sin obtener mejoría y además tuvo que suspender el tratamiento por presentar intolerancia gástrica al MMF.

CONCLUSIONES

El MMF se emplea en el Servicio de Oftalmología para una amplia variedad de diagnósticos, pero los resultados de eficacia obtenidos no son muy satisfactorios, a pesar de que diversas publicaciones lo proponen como una buena alternativa terapéutica en este tipo de patologías, comparándolo en eficacia a la ciclosporina e indicando tasas de rechazo del 0% a los 3 años en el caso del trasplante de córnea. En relación al aspecto de seguridad, no se han presentado efectos adversos graves.

CONFLICTO DE INTERESES: No