

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN A TRATAMIENTO CON ADALIMUMAB


Fuster Sanjurjo L, Salazar Laya B, Rodríguez Penín I, López Sandomingo L, Domínguez Urbistondo G, Freire Fojo A
 Servicio de Farmacia. Hospital Arquitecto Marcide. Área Sanitaria de Ferrol

Objetivo

Valorar la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en pacientes con enfermedad de Crohn (EC) tratados con adalimumab. Analizar la utilización de adalimumab y valorar efectividad y tolerancia al tratamiento.

Material y método

- **Diseño:** Estudio retrospectivo
- **Población:** Todos los pacientes que recibieron adalimumab para el tratamiento de la EC durante al menos 8 semanas.



Resultados



LOCALIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD	
COLON	14 pacientes
PERIANAL	12 pacientes
ÍLEON	10 pacientes
ILEOCECAL	5 pacientes
INTESTINO DELGADO	2 pacientes

13 PACIENTES PRECISARON INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS PREVIAS

TODOS LOS PACIENTES REQUIRIERON INGRESO HOSPITALARIO ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO CON ADALIMUMAB

TRATAMIENTOS PREVIOS	
MESALAZINA, CORTICOIDES E INMUNOSUPRESORES	17 pacientes
INFLIXIMAB	13 pacientes
ANTIBIÓTICOS	16 pacientes

MOTIVOS SUSPENSIÓN INFLIXIMAB	
INEFICACIA	7 pacientes
INTOLERANCIA	5 pacientes
DESCONOCIDO	1 paciente

TRATAMIENTO CON ADALIMUMAB			
TRATAMIENTOS CONCOMITANTES		PAUTA POSOLÓGICA	
MONOTERAPIA	16 pacientes	CADA 14 DÍAS	13 pacientes
CON ENEMAS DE BUDESONIDA	2 pacientes	CADA 7 DÍAS	5 pacientes

VARIABLES	AL INICIO DEL TRATAMIENTO		AL FINALIZAR EL PERIODO DE ESTUDIO	
	PESO	61,7 Kg	64,4 Kg (n =16)	
NÚMERO DE DEPOSICIONES	6-8	3-4 (n =17)		
PCR	26,8 mg/L (n =16)	16,7 mg/L		
VSG	33,7	18,4		
HEMOGLOBINA	CONSTANTE			
ALBÚMINA	CONSTANTE			

IBDQ-32 valor medio: 151,5 (n = 12)

78% de pacientes mejoría subjetiva de la enfermedad (n =14)

BUENA TOLERANCIA

Reacciones cutáneas: 4 pacientes
Síndrome pseudo gripal: 1 paciente

Conclusiones

- El valor de IBDQ-32 obtenido en nuestra serie es coincidente con los datos procedentes de la bibliografía alcanzándose valores próximos a la remisión clínica (IBDQ-32 >170).
- El tratamiento se muestra efectivo y bien tolerado.
- Se propone como medida de evaluación de la efectividad del tratamiento la determinación del IBDQ-32 al inicio de la terapia con adalimumab y a intervalos regulares.