

# Evaluación De La Duración Del Tratamiento De La Hepatitis C En Pacientes coinfecados Con VIH. Influencia En La Respuesta Viral Sostenida.

Martínez Crespo A, Apesteguía El Busto A.  
Hospital Clínico Universitario Lozano-Blesa.  
(Zaragoza).

## OBJETIVO

Analizar la respuesta al tratamiento de la hepatitis C en pacientes coinfecados VIH según la duración del tratamiento.


## MÉTODO

Se realizó un estudio retrospectivo. Se incluyeron en éste aquellos pacientes en tratamiento de la hepatitis C coinfecados con VIH que recogieron peginterferón alpha (2a o 2b) y ribavirina en nuestro servicio y en los que se disponía del valor del RNA-VHC 24 semanas después de la finalización del tratamiento. El éxito del tratamiento se establece en función de la variable principal: respuesta viral sostenida. Definida ésta como carga viral de VHC indetectable 6 meses después de concluir la terapia. La carga viral se midió en UI/ml, con un límite de sensibilidad de 50 UI/ml. El análisis se realizó por intención de tratar. Los pacientes a los que se les suspendió el tratamiento por reacciones adversas a medicamentos, se consideraron como fracaso. Para analizar la duración del tratamiento se utilizó el parámetro % de duración respecto del tratamiento estándar, que resulta de dividir en cada paciente el número de semanas de tratamiento entre las semanas de tratamiento estándar (48) y multiplicar por 100. Las semanas de tratamiento estándar se eligieron según lo establecido en la bibliografía.

La recogida de datos clínicos y analíticos se realizó a través de las historias clínicas. El historial farmacoterapéutico se obtuvo del programa de dispensación a pacientes externos Farmatools®.

Los pacientes se clasificaron en dos grupos: El primer grupo lo formaban los pacientes con duración de tratamiento igual o mayor al 80% del estándar, en el segundo grupo se incluyeron los pacientes con una duración del tratamiento inferior al 80% del estándar. Para comparar ambos grupo se realizó la prueba de  $\chi^2$ . El análisis estadístico se hizo con el programa SPSS versión 14.0.

## RESULTADOS



El análisis estadístico nos muestra una diferencia justo en el límite de los significativo a favor de los pacientes cuya duración del tratamiento fue mayor ( $p=0,05$ ).

## CONCLUSIÓN

La duración del tratamiento es un factor que influye en el éxito de la terapia de la hepatitis C en los pacientes coinfecados con VIH.