

# ANÁLISIS DE LAS DISPENSACIONES A PACIENTES EXTERNOS DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA

RODRIGUEZ M.A., PINTOR R., MUÑOZ M., SERNA J., BERMEJO T.  
SERVICIO DE FARMACIA. HOSPITAL RAMON Y CAJAL. MADRID



Hospital Universitario  
Ramón y Cajal  
Comunidad de Madrid

## OBJETIVO

Clasificar y cuantificar las dispensaciones de medicación en la Consulta de Atención Farmacéutica a pacientes externos (PEX) no pertenecientes a nuestra comunidad autónoma (CCAA).

## MATERIAL Y METODOS

El estudio se realizó en un Hospital general de nivel 3 durante el año 2007 con la herramienta informática Paciwín® seleccionando todos los PEX que recogían medicación en la Consulta en una hoja de cálculo Excel con las siguientes variables: CIAS, número de historia, especialidad y cantidad dispensada, indicación, P.V.F. y si la dispensación fue puntual o habitual.

•Las patologías para las que se utilizaron los medicamentos dispensados se agruparon en

- AR (artritis reumatoide)
- ESM (esclerosis múltiple)
- ELA (esclerosis lateral amiotrófica)
- EPOIRH (Eritropoyetina tras isf renal)
- EPOPQ (Eritropoyetina tras quimioterapia)
- FECPPQ (Factor estimulante de colonias postquimioterapia)
- FECPT (factor estimulante de colonias pre-trasplante)
- FQ (fibrosis quística)
- HB (hepatitis B)
- HCC (hepatitis C)
- HCREC (hormona crecimiento)
- HIV (virus de inmunodeficiencia humana)
- HPP (hipertensión pulmonar)
- MEX (medicamento extranjero)
- MUC (medicamento de uso compasivo) y PEX (otros).

•Se analizó si a estos pacientes se les dispensaba la medicación de manera habitual o puntual. Se excluyeron aquellos pacientes cuyo CIAS (código identificación asistencia sanitaria) pertenecía a nuestra comunidad. En un reducido número de PEX no se pudo obtener el CIAS.

## CONCLUSIONES

- Hay un elevado número de dispensaciones y gasto asociado a pacientes de otra CCAA y/o que no disponen de datos de su Tarjeta Sanitaria.
- En las dispensaciones a pacientes habituales de otra CCAA destacan pacientes VIH positivos y pacientes con medicación autorizada como uso compasivo.
- En las dispensaciones a pacientes puntuales de otra CCAA destacan pacientes VIH positivos y pacientes con medicación para el acondicionamiento para el trasplante de médula ósea.



## RESULTADOS

Se realizaron 44.637 dispensaciones durante el año 2007

|                               | Nº de DISPENSACIONES |
|-------------------------------|----------------------|
| CA de MADRID                  | 41.713               |
| OTRAS CCAAs                   | 2.198                |
| OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS | 166                  |
| SIN DATOS                     | 560                  |
| TOTAL                         | 44.637               |



El consumo de medicación dispensada en la consulta de PEX fue de 26.281.193 €. Se confirmó que la CCAA del paciente era distinta a la nuestra en un 4,92% y de otra entidad colaboradora en 0,4%. No se pudo asignar la CCAA de procedencia del paciente en un 1,20%



La patología para la que se utilizó la medicación dispensada a pacientes de otras CCAA u otras entidades colaboradoras se observa en la siguiente tabla:

|        |        |
|--------|--------|
| VIH    | 58,14% |
| MUC    | 10,29% |
| ESM    | 7,32%  |
| FECPPQ | 5,09%  |
| EPOPQ  | 3,90 % |

El 96,30% de las dispensaciones de medicación fueron a pacientes que acudían a nuestra consulta de forma habitual y las indicaciones mayoritarias fueron VIH, MUC y ESM.

El 4,70% fueron dispensaciones puntuales y las indicaciones mayoritarias fueron VIH, EPOPQ y FECPT .