


ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE UN PROGRAMA DE AJUSTE POSOLÓGICO DE HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL.

Gil Máñez E., Gea Rodríguez E., García Fernández M.D., Nadal Llover M., Barral Viñals N.

- ✓ Analizar los resultados de un programa de ajuste posológico en pacientes con insuficiencia renal (IR) aplicado a las heparinas de bajo peso molecular (HBPM).
- ✓ Comparar los resultados con los obtenidos al inicio del programa (enero 2001- abril 2002).



MATERIAL Y MÉTODOS:

- ✓ DESCRIPCIÓN: estudio prospectivo de cuatro años de duración (enero 2004 - diciembre 2007).
- ✓ VALORACIÓN: Respuesta valorable: CrCl > 30ml/min, stop HBPM en 24-48h, alta hospitalaria.
- ✓ ALGORITMO DE ACTUACIÓN:




RESULTADOS:

- ✓ El número de ingresos durante el periodo de análisis ha sido de 27.735, de los cuales el 46% han recibido HBPM, siendo un 90% HBPM para profilaxis y 10% para tratamiento.
- ✓ Se han realizado 615 intervenciones farmacéuticas (IF), de las cuales el 54% han sido valorables. De las intervenciones farmacéuticas valorables, han sido aceptadas el 43%.



Grado de aceptación de las intervenciones farmacéuticas



CONCLUSIONES:

- ✓ Se evidencia una evolución positiva entre los dos periodos respecto al ajuste de las HBPM en IR.
- ✓ El grado de aceptación es proporcional a la severidad de la IR excepto en el caso de HBPM-TBR donde el médico valora inferiores los riesgos asociados a las HBPM que al uso de una heparina no fraccionada.
- ✓ A pesar de la reducción de la realización de IF activas, sólo se observa una disminución del 6.12% (periodo implantación: 70%, periodo producción 64%) en la aceptación de las IF.