

ANÁLISIS DE LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS ASOCIADOS A UNA SOSPECHA DE EXTRAVASACIÓN

Ramírez Herráiz E, Vicente Sánchez P, Apezteguia Fernández C, Díez Fernández R, Arteta Jiménez M.
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario de Getafe , Madrid.

OBJETIVO

Enunciar y analizar los síntomas descritos por los pacientes ante una sospecha de extravasación ya que los estudios que describen la clínica de las extravasaciones de citostáticos son escasos.

MÉTODO

- El Servicio de Farmacia y el Hospital de Día de Oncología y Hematología del hospital, disponen de protocolos de actuación en una extravasación consensuados e individualizados para cada fármaco citostático.
- El farmacéutico recopila información en una hoja de recogida de extravasaciones donde refleja si existe dolor, hormigueo, hinchazón, enrojecimiento, picor, frío o calor en la zona de punción tras una entrevista con el paciente.

RESULTADOS

- Marzo 2005 hasta Abril 2008:
- 52 extravasaciones de fármacos citostáticos.
- ❖31 % antraciclinas.
 - ❖36 % taxanos.
 - ❖10 % derivados de la vinca.
 - ❖23 % otros fármacos.



Fotos realizadas por el Sº Farmacia 2005-2008

Síntomas	Dolor	Hormigueo	Hinchazón	Enrojecimiento	Picor	Frío	Calor
Porcentaje (%)	34,62	9,62	44,23	26,92	15,38	0	5,77

El **picor** es **característico de la extravasación de antraciclinas** con un riesgo relativo de 3,3 (IC 95% 1,68 a 6,49) respecto al resto de fármacos citostáticos.

En cuanto al resto de síntomas no existen diferencias entre grupos.

CONCLUSIONES

- ✓ La hinchazón es el signo más frecuente en los pacientes con sospecha de extravasación por lo que el personal de enfermería debe estar atento a su posible aparición durante la administración de quimioterapia.
- ✓ Se debe insistir a los pacientes que vayan a recibir antraciclinas que comuniquen cualquier sensación de picor en la zona de punción.