


ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES CON TRATAMIENTO PARA LA HEPATITIS C CRÓNICA: ADHERENCIA, EFECTIVIDAD Y EFECTOS ADVERSOS

Domínguez Urbistondo G, Casás Martínez A, López Sandomingo L, Freire Fojo A, García Iglesias A
 Servicio de Farmacia. Hospital Arquitecto Marcide. Área Sanitaria de Ferrol

Objetivos:

Describir la atención farmacéutica realizada a pacientes con hepatitis C, valorar el cumplimiento del tratamiento, la efectividad y la aparición y tolerabilidad de efectos adversos secundarios a la administración de ribavirina e interferon pegilado.

Material y métodos:



Resultados:

DATOS GENERALES:

70 pacientes
 44 hombres
 26 mujeres
 Edad media: 45,62 años

GENOTIPOS:
 Genotipo 1: 71,42 %
 Genotipo 2: 6 %
 Genotipo 3: 16 %
 Genotipo 4: 7 %

DATOS EFICACIA

22 PACIENTES RESPONDEDORES RÁPIDOS
 12 RESPUESTA VIRAL SOSTENIDA
 (18 PACIENTES COMPLETARON TRATAMIENTO)



Conclusiones:

- ✓ La eficacia y los efectos adversos descritos se corresponden con los encontrados en la bibliografía
- ✓ La atención farmacéutica en estos pacientes ha contribuido a una mejor tolerabilidad del tratamiento que se traduce en una mayor adherencia y efectividad.