

*Álvarez López, M.M, Lozano Toledo, R., Moreno Perulero M.L, Bocanegra Bolívar, M.A, Campanario López, I.
C. Encinas Barrios. Servicio de Farmacia. Hospital General de Ciudad Real.*

INTRODUCCIÓN

Atosiban está indicado para el retraso del parto prematuro. En nuestro hospital fue incluido en la Guía Farmacoterapéutica junto con un protocolo de utilización por la Comisión de Farmacia y Terapéutica (CFyT). Dicho protocolo restringe la prescripción de atosiban a las pacientes con amenaza de parto prematuro cuando se cumplen algunas de las siguientes premisas: enfermedad cardíaca, hipertiroidismo, diabetes o intolerancia a la ritodrina.

OBJETIVO



Evaluar la adherencia de las prescripciones de atosiban al protocolo de utilización del mismo, así como la eficacia en el retraso del parto prematuro y su seguridad.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo de las pacientes tratadas con atosiban, desde la aprobación (septiembre del 2007) del protocolo de utilización por la CFyT hasta la actualidad. Se identificaron las pacientes mediante los impresos específicos de solicitud de atosiban. Los datos obtenidos, tras la revisión de las historias clínicas, fueron los siguientes: edad gestacional en el momento del tratamiento, fecha del parto, tratamientos previos y posteriores a atosiban, número de ciclos del tratamiento, maduración pulmonar fetal y reacciones adversas.


RESULTADOS

Durante el período de estudio, 16 pacientes se trataron con atosiban.



Todas las pacientes completaron el tratamiento con corticoides para la maduración pulmonar fetal.

7 de las pacientes recibieron más de un ciclo de tratamiento



SEGURIDAD

En 2 pacientes la perfusión fue suspendida debido a reacciones adversas: en una de ellas por taquicardia y en otra por hipotensión

CONCLUSIONES

- El número de prescripciones que cumplen el protocolo de utilización de atosiban ha sido menor de lo esperado. Sería necesario revisar las condiciones de uso establecidas.
- En la mayoría de las paciente, el tratamiento con atosiban retrasó el parto el tiempo necesario para la administración del tratamiento con corticoides indicados en la maduración fetal.
- Las reacciones adversas fueron similares a las descritas en la literatura.

BIBLIOGRAFÍA

- Ficha técnica Tractocile® (Atosiban) Enero 2005.
- "Protocolo de utilización de Tractocile® (Atosiban)" redactado por la Comisión de Farmacia y Terapéutica del Hospital General de Ciudad Real.