




ESTUDIO PROSPECTIVO PILOTO DE UTILIZACIÓN DEL PARCHÉ TRANSDÉRMICO DE FENTANILO

Chumillas Chevalier E, Cañete Ramirez C, Monfort Cervera MP, Pardo Sánchez R, Aguilera Vicente T, Gallart Mora MJ.
Servicio de Farmacia. Hospital Joan XXIII de Tarragona

OBJETIVO

Valorar la utilización del parche transdérmico de fentanilo y adecuar su uso dentro de las indicaciones y posología autorizadas.

MÉTODO

Estudio prospectivo de las prescripciones médicas recibidas por el Sistema de Distribución de Dosis Unitaria (SDMDU), en el que se analiza indicación, dosis prescrita y posibles interacciones del fentanilo transdérmico. En aquellas prescripciones no adecuadas, se contacta con el clínico y se le facilita una hoja de información de dicho fármaco, donde se le informa de los posibles efectos secundarios peligrosos para la vida debido a un uso inapropiado.

RESULTADOS

•Periodo del estudio: 2 meses

•Pacientes: 28

•Edad media: 71 años

•Sexo: 53,57% , 46,43%

•Servicios:

- 32.14% Medicina Interna

- 14.29% Cirugía General


- 10,71% Cardiología

•Prescripción fentanilo:


- 53,57% domiciliaria

- 46,43% hospitalaria

Servicio prescriptor



Tipo de dolor a tratar




Interacciones

28,57% tomaban fármacos que podían interaccionar con el parche.




87,5% derivados mórficos
12,5% inhibidores de la proteasa (ritonavir)


Prescripciones médicas



Causa de la prescripción inadecuada



Intervenciones



CONCLUSIÓN

El estudio de utilización de los fármacos permite adoptar medidas para optimizar las prescripciones por parte de los clínicos. El farmacéutico debe intervenir activamente para mejorar la eficacia y la seguridad de los fármacos, aumentando la calidad de vida de los pacientes.

Conflicto de interés: Ninguno

Email: echumillas.hj23.ics@gencat.cat

53 Congreso de la SEFH. Valencia 2008.