

Ibarra Barrueta O<sup>1</sup>, Gorostiza Hormaetxe I<sup>2</sup>, Vilella Ciriza M<sup>3</sup>, Irastorza Larburu B<sup>4</sup>, Guisasola Ron L<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Hospital de Galdakao- Usansolo  
<sup>2</sup> Dirección de Farmacia. Gobierno Vasco.

<sup>3</sup> Hospital Basurto

<sup>4</sup> Hospital Donostia

<sup>5</sup> Hospital Txagorritxu

E-mail: mariaolatz.ibarrabarrueta@osakidetza.net

## OBJETIVO

Estudio de prevalencia del uso de anti- TNF en pacientes con "psoriasis en placas" en cuatro hospitales del País Vasco



## Material y Métodos

Fármacos a estudio: AntiTNF de dispensación y uso hospitalario

Se recoge información sobre el paciente, el fármaco empleado y las características de su administración

Recogida de datos: diciembre del 2007



## RESULTADOS

- o 59 pacientes con psoriasis (71,2% hombres; edad media 49 años) en tratamiento con un antiTNF
- o Tiempo medio desde inicio de tratamiento biológico: 16,2 meses (DE: 7,90)
- o Anti TNF:

1 con infliximab y 58 con etanercept.

48,2% etanercept de 25 mg (gran variabilidad entre hospitales, 25%- 80%)

Consumo de etanercept en dermatología respecto al total consumido (diciembre del 2007): 37,2%- 56,5%, según el hospital.

Un solo cambio de tratamiento (un paciente al que se le suspendió el etanercept por ineficacia y se le pautó infliximab).

- o Pauta posológica: Dosis semanal

- 48% de los pacientes, dosis semanal de **50mg** (10% en dos tomas semanales y el 38% en una única administración semanal)
- 40% dosis semanal de **100mg** (divididos en dos tomas)
- 12% dosis semanal de **25mg**.

## CONCLUSIONES

- El antiTNF más empleado en diciembre del 2007 en la psoriasis en placas en nuestros hospitales fue el etanercept.
- Se evidencia una gran variabilidad en las dosis semanales, destacando especialmente el 12% de los pacientes con una pauta semanal de 25 mg, cuando la dosificación recomendada es de 2 veces por semana.

