

# ARTRITIS REUMATOIDE: TRATAMIENTO CON RITUXIMAB

Gimeno M, Alcácer MA, Apesteguía A, Pardo P, Montis F.

Servicio de Farmacia. Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa". Zaragoza.

## Objetivo:

Analizar la experiencia clínica del tratamiento con rituximab en pacientes con artritis reumatoide.

## Métodos:

**Población a estudio:** pacientes con artritis reumatoide que recibieron uno o más ciclos de rituximab.


**Tipo y período de estudio:** retrospectivo, de enero de 2006 hasta abril de 2008.

**Fuente de datos:** historia clínica y perfil farmacoterapéutico del paciente (programa informático del Servicio de Farmacia -Dominion versión 2.4-).

**Datos recogidos:** tratamientos anteriores recibidos, causa de interrupción, dosis de rituximab en cada ciclo, tolerancia al tratamiento y posibles efectos adversos del mismo. Parámetros basales y posteriores a cada ciclo de tratamiento con rituximab para evaluar la actividad de la enfermedad: VSG, PCR, EVA y DAS 28 (objetivo terapéutico DAS 28 < 3,2).

## Resultados:


En el periodo de estudio, 9 pacientes recibieron tratamiento con rituximab



Se analizaron a 6 pacientes


### TRATAMIENTOS ANTI-TNF ANTERIORES

Número de anti-TNF recibidos







■ 3 anti-TNF ■ 2 anti-TNF ■ Ninguno

Causas de interrupción del tratamiento



■ no respuesta ■ intolerancia

### EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD EN EL PRIMER CICLO DE TRATAMIENTO CON RITUXIMAB



Un ciclo: dos infusiones de 1000mg de rituximab separadas en un intervalo de dos semanas

67% de los pacientes recibieron dos ó más ciclos en el periodo de estudio

## Conclusiones:

La aprobación de rituximab en artritis reumatoide ha demostrado ser una alternativa eficaz al tratamiento con anti-TNF, en aquellos pacientes que no responden a ellos, no los toleran o para los que están contraindicados.