

USO COMPASIVO EN ONCO-HEMATOLOGÍA: RESULTADOS CLÍNICOS OBTENIDOS.

Pou Alonso A., Rodríguez Gómez PM., Peña Pou R., Moleón Ruíz M., Molina Cuadrado E., Fernández Ávila JJ.

Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería.

Objetivos


Analizar los fármacos solicitados como UC en onco-hematología, valorar el coste de la terapia y evaluar los resultados clínicos obtenidos.

Resultados

DISTRIBUCIÓN POR SERVICIOS



DISTRIBUCIÓN POR SEXO



• Se solicitaron 46 UC para 40 pacientes y para 27 indicaciones distintas, todos ellos aprobados por la DGFP.

• La edad media fue de 48,6 años en adultos y de 9,2 en pacientes pediátricos.

• El coste medio de los tratamientos antineoplásicos solicitados por UC fue de 10.325€, destaca el elevado coste de los tratamientos con lenalidomida y azacitidina.

INDICACIÓN	FÁRMACOS SOLICITADOS COMO UC
Neuroblastoma	Isotretinoína (3), Temozolamida (2), Bortezomib
Sindr. Mielodisplásico	Lenalidomida (2), Azacitidina (2)
Anemia hemolítica autoinmune	Rituximab (2)
Anemia refractaria	Azacitidina (3)
Inmunodeficiencia 1ª en niños	Inmunoglobulina (3)
Melanoma	Interferon alfa 2b, Carboplatino+Paclitaxel
Ca gástrico	Carboplatino, Cetuximab
Mieloma múltiple	Lenalidomida
Aplasia medular	Inmunoglobulina antitimocítica (2)
Sarcoma Ewing	Irinotecan+Temozolamida, Topotecan+Carboplatino
Ca recto	Bevacizumab, Cetuximab
Linfocitosis	Inmunoglobulina
Astrocitoma	Irinotecan
Ca maxilar	Capecitabina
Ca neuroectodérmico	Trabectedina
Melanoma cerebral	Temozolamida
Ca mama	Carboplatino+Docetaxel
Mesotelioma peritoneal maligno	Pemetrexed + Cisplatino
LLA	Dasatinib
Hepatocarcinoma	Sorafenib
Linfoma no Hodking	Temozolamida
Anemia aplásica	Eritropoyetina
Mielofibrosis idiopática	Lenalidomida
Ca laringe	Cetuximab
Enf de Hodking	Rituximab
Ca esófago	Cisplatino+Cetuximab
Seminoma testicular	Carboplatino

Remisión completa de la enfermedad (7 tratamientos)

- 8 de los tratamientos continúan administrándose presentando buena respuesta.
- 5 tratamientos lograron respuesta parcial.
- 15, produjeron fracaso terapéutico, de éstos, en 13 casos hubo progresión de la enfermedad, falleciendo 9 pacientes.
- 9 tratamientos no se pudieron valorar: 4 de ellos pendientes de analíticas y pruebas complementarias para el juicio clínico.
- 2 tratamientos se suspendieron por toxicidad: intolerancia a lenalidomida y toxicidad cutánea a cetuximab.

Conclusiones

Existe una elevada demanda por los servicios de onco-hematología para la tramitación de fármacos como uso compasivo para diversas indicaciones, para todas ellas se aprueba su administración.

El elevado coste de los tratamientos fue asumido en todos los casos.

El conocimiento de los resultados de eficacia y tolerancia de los tratamientos de uso compasivo proporciona información muy importante para el futuro planteamiento terapéutico de otros pacientes.