


EVALUACIÓN DE UN PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE CEFDITORENO PIVOXILO

Sanz Tamargo G, Matoses Chirivella C, Devesa García C, Peral Ballester L, Julian Ávila E, Antón R

Servicio de Farmacia. Hospital General Universitario de Elche.



El cefditoreno pivoxilo, fue incluido en la Guía Farmacoterapéutica del hospital con la condición de "terapia secuencial por tratamiento previo con cefalosporinas de 3ª generación vía parenteral".





OBJETIVO: Describir el seguimiento de un protocolo de uso de cefditoreno pivoxilo aprobado por la Comisión de farmacia y terapéutica (CFyT).

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional, retrospectivo, de todos los pacientes tratados con cefditoreno durante el periodo Julio 2007-mayo 2008.


FUENTES DE INFORMACIÓN: Farmacia(Farmasyst®) Microbiología(Microlab®) (programas informáticos) Admisión (Hygia®) Historias Clínicas

DATOS RECOGIDOS: Demográficos Bioquímicos Microbiológicos Hematológicos Perfil Farmacoterapéutico

RESULTADOS: ✓ 26 pacientes (20) ✓ Edad media: 69 años (18-84)



▪ Ningún caso con **IH** grave, 4 casos con **IR moderada-grave** (2 casos con ajuste posológico).
▪ 10 pacientes tto concomitante con diuréticos → Ninguna **reacción adversa**.



CONCLUSIONES: El uso del cefditoren se adapta en un 69% a las condiciones de utilización aprobadas en la CFyT. Se propone realizar el seguimiento más exhaustivo de forma prospectiva para promover la adecuada utilización del mismo.

Los autores de la presente comunicación declaran no tener ningún conflicto de intereses referente a la misma.