

Efectividad Farmacoterapéutica Antihipertensiva en Pacientes de Edad Avanzada Institucionalizados

Elena López Montero Elena, Keyna Rivera Rodríguez,
Carlos Crespo Diz*, M^a Teresa Chuclá Cuevas

*Unidad de Atención Farmacéutica Socio-Sanitaria
Servicio de Farmacia*

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela



SERVIZO
GALEGO
de SAÚDE

Complejo Hospitalario Universitario
de Santiago de Compostela
Santiago de Compostela

ZARAGOZA , 22-25 Septiembre 2009

ZARA
GOZA
2009



54 SEFH
CONGRESO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE FARMACÉUTICOS DE HOSPITAL

FARMACIA,
HOSPITAL, AGUA
Y DE SAUDES
SOSTENIBLE

Objetivos / Tipo de Estudio

FARMACOTERAPIA Anti-HTA

Pacientes
Edad
Avanzada

Práctica Clínica Habitual

Centros SS Larga Estancia

Estudio Longitudinal Prospectivo 6 meses

EFFECTIVIDAD ANTIHIPERTENSIVA

Material y Métodos

Hipertensión Arterial

85 Pacientes

NO Diabetes Mellitus

83 ± 8,3 años

Monoterapia HTA

PA Normalidad

MONITORIZACIÓN HTA

Seguimiento Farmacoterapia

Seguimiento Cifras PA

Medicamentos Utilizados

Modificaciones Tto

Inicio

Modificación

Final

CGT

BT

TT


140 mm Hg ≥

PA

≤ 90 mm Hg


Resultados: Medicamentos Utilizados

Distribución de Tratamientos- Inicio Estudio




Resultados: Medicamentos Utilizados

Evolución de Tratamientos- Final Estudio




Resultados: Mismo Tratamiento




Efectividad: 90,3% de los Tratamientos

Resultados: Cambio Grupo Terapéutico



	CGT	Efectividad
IECA	ARAI, α -BQ, $\alpha\beta$ -BQ	100%
ARAI	Diu, β -BQ	50% (Diu)

Resultados: Cambio de MT a BT



	BT	Efectividad
IECA	+ α -BQ	100%
ARAII	+ Diu	100%
Diu	+ β -BQ, + α -BQ, + ARAII	100%



SERVIZO
GALEGO
de SAÚDE

Complejo Hospitalario Universitario
de Santiago de Compostela
Santiago de Compostela

ZARAGOZA , 22-25 Septiembre 2009

ZARA
GOZA
Z'09




54 SEFH
CONGRESO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE FARMACÉUTICOS DE HOSPITAL

FARMACIA,
HOSPITAL, AGUA
Y DE SAUDES
SOSTENIBLE

Resultados: Efectividad Control PA 6 meses

□ PA Controlada

■ PA No Controlada



Tratamiento

Efectividad

MT

90,3%

CGT

75%

BT

100%

TT

0%

Conclusiones

1. La Efectividad antihipertensiva de los tratamientos resultó cercana al 90% para el total de pacientes durante los 6 meses de estudio.
2. Los cambios de Monoterapia a Biterapia resultaron de mayor efectividad que la continuación de tratamiento en Monoterapia con cambio de grupo terapéutico.
3. La Monoterapia antihipertensiva parece ser la mejor estrategia para el control de la PA en Pacientes de Edad Avanzada Hipertensos No Diabéticos, institucionalizados en centros de larga estancia.



XACOBEO 2010 Galicia

Santiago de Compostela

