



Nº 960



Temas: Atención Farmacéutica, Gestión y Varios
COMUNICACIÓN ORAL

**Impacto de la Intervención Farmacéutica
en la Solución de Resultados Negativos al
Tratamiento Biológico y Adherencia en
Pacientes Diagnosticados de Artritis
Reumatoide en Tratamiento Biológico**


Domingo Ruiz MA, Jiménez Morales A*, Calleja Hernández
MA*, Zarzuelo Zurita A***, Sánchez Castellón A**, Alañón Pardo
AM***

* Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

** Hospital General de Área Rafael Méndez. Lorca (Murcia).

*** Dpto. de Farmacología. Facultad de Farmacia. Univ. de Granada.

Zaragoza, 2009




Objetivos

Evaluar el impacto de la intervención farmacéutica en la **solución de resultados negativos a la terapia biológica** y en la evolución de la **adherencia** de pacientes diagnosticados de artritis reumatoide.


Estudiar la **evitabilidad** de los problemas de salud relacionados con el tratamiento biológico.

Método. Diseño del estudio


Estudio prospectivo,
aleatorizado y controlado



Método. Intervención Farmacéutica



Método DADER: 3ª Revisión, 2005
3º Consenso de Granada, 2007



Método. Variables

- Metodología DADER de Seguimiento Farmacoterapéutico:

Método DADER: 3ª Revisión, 2005
3º Consenso de Granada, 2007

Necesidad, Efectividad, Seguridad

- Importancia de la IF para la solución de PS relacionados con fármacos: ODDS RATIO


- Adherencia: test de SMAQ/Morisky-Green-Levine

Knobel H. AIDS 2002
Morisky DE. Med Care 1986

- Evitabilidad: Criterios de Baena MI, 2002

Baena MI. Pharm Care Esp 2002

Resultados. RNM



Resultados. Odds Ratio

GLOBAL*	PS resuelto	PS no resuelto	TOTAL
Intervención Aceptada	48	27	75
Intervención no Aceptada	15	32	47
TOTAL	63	59	122
INFLIXIMAB*	PS resuelto	PS no resuelto	TOTAL
Intervención Aceptada	19	10	29
Intervención no Aceptada	1	8	9
TOTAL	20	18	38
ETANERCEPT*	PS resuelto	PS no resuelto	TOTAL
Intervención Aceptada	7	10	17
Intervención no Aceptada	12	10	22
TOTAL	19	20	39
ADALIMUMAB*	PS resuelto	PS no resuelto	TOTAL
Intervención Aceptada	22	7	29
Intervención no Aceptada	2	14	16
TOTAL	24	21	45

15,2 (1,65-139,3)

0,58 (0,16-2,09)

22,0 (3,98-121,43)

Infliximab: $p = 0,007$ (significación estadística <0.05).

Etanercept: $p = 0,408$.

Adalimumab: $p = 0,000$ (significación estadística <0.05).

IC 95%



Resultados. Evitabilidad


Infliximab: 40,27%

Etanercept: 38,82%

Adalimumab: 34,4%

Resultados. Adherencia





Conclusiones

En los pacientes tratados con terapia biológica es fundamental mantener una vigilancia respecto a la seguridad y la efectividad del tratamiento.

La intervención del farmacéutico resuelve los PS asociados a la terapia biológica, existiendo riesgo de que no se resuelva un PS por no ser aceptada dicha intervención.

La intervención del farmacéutico mejora la adherencia, pudiendo repercutir en la efectividad y seguridad del tratamiento biológico.