

TERAPIA ANTIRRETROVIRAL EN ADULTOS VIH DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN EL AÑO 2009

Bachiller Cacho MP, Asensio Bermejo A, López Arzoz G, Irastorza Larburu B, Sáenz de Buruaga A, Mauleón Echeverría N. Servicio de Farmacia . Hospital Donostia. San Sebastián. Gipuzkoa

Objetivo


Analizar la terapia antirretroviral (TAR) de los pacientes VIH controlados en nuestro hospital.

Método

Estudio descriptivo de los tipos de TAR a fecha 1 de enero de 2009. Los datos se han obtenido de los registros de dispensación informatizados en el Servicio de Farmacia.

Resultados

- Nº pacientes adultos VIH con TAR a 01/01/2009: 1.086
- Nº terapias diferentes: 157
- Nº principios activos (p.a.): 21.
- Todos reciben terapias vía oral y 1 enfuvirtide (T-20) vía s.c.
- Tipos de TAR según nº de p.a. incluidos:



- Terapias con IP: 398 pacientes (36,6%). El más utilizado: lopinavir/r.
- Terapias TAR recibidas por el 50% de los pacientes:

Terapia TAR	Nº pacientes	%
Tenofovir-Emtricitabina (Truvada®) + Efavirenz ó Tenofovir-Emtricitabina-Efavirenz (Atripla®)	182	16,7
Abacavir-Lamivudina-Zidovudina (Trizivir®)	152	14
Abacavir - Lamivudina (Kivexa®)+ Efavirenz	93	8,5
Tenofovir-Emtricitabina (Truvada®)+Lopinavir/ritonavir	81	7,4

- Nº de tomas de medicamentos/día, nº formas farmacéuticas (FF)/día y nº de pacientes

Nº tomas/día	Nº pacientes	%
1	422	39
2	663	61
3	1	0,1

Nº FF/día	Nº pacientes	%
1	89	8
2	345	31,7
3	186	17,1
4	87	8
5	191	17,5
6-8	150	13,8
9-10	29	2,7
11-15	9	0,8

Tipos de TAR por grupos farmacológicos y nº de pacientes		
Tipo de terapia TAR	Nº pacientes	%
Monoterapia	12	1,1
1ITIAN	1	
1IP	11	
Doble terapia	30	2,8
1ITIAN+ 1IP	19	
1ITINAN+ 1IP	11	
Triple terapia	1.004	92,4
3ITIAN	158	14,5
2ITIAN+ 1ITINAN	507	46,7
2ITIAN+ 1IP	281	25,8
1ITIAN+ 1ITINAN + 1IP	33	
2ITIAN+ 1 II	5	
1ITINAN + 1IP + 1 II	3	
1ITIAN+ 2IP	2	
1ITIAN+ 1 IP + T-20	1	
1ITINAN+ 1IP+ 1II	4	
1IP+ 1II+ 1ICCR5	10	
Cuádruple terapia	33	3
4 ITIAN	12	
3 ITIAN+ 1 ITINAN	5	
3 ITIAN+ 1 IP	6	
2 ITIAN + 1ITINAN + 1IP	6	
2 ITIAN + 1 IP + T-20	2	
2 ITIAN+ 1IP+ 1 ICCR5	1	
1 ITINAN+ 1 IP+ 1II+ 1 ICCR5	1	
Quintuple terapia	6	0,5
4ITIAN + 1IP	2	
2ITIAN +1ITINAN+ 1IP+ 1II	2	
3 ITIAN + 1IP+ 1II	1	
2ITIAN +1IP+ 1II+ 1ICCR5	1	
Sextuple terapia	1	0,1
2 ITIAN+ 1 ITINAN+ 1IP+ 1 II+ 1ICCR5	1	
TOTAL	1086	

ITIAN: inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos; ITINAN: inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos; IP: inhibidores de proteasa; IF: inhibidor de la fusión; II: inhibidor de la integrasa; ICCR5: inhibidor co-receptor CCR5.

Conclusiones

- La terapia antirretroviral más frecuente recibida por el 50% de los pacientes VIH de nuestro hospital ha sido 2 ITIAN+ 1 ITINAN.
- La mayoría de los pacientes (99,7%) realizaban 1 ó 2 tomas/día y el 40 % tomaban únicamente 1-2 comp./día