

Sanz Arrufat A., Pagán Núñez FT,
Sanchez Serrano JL*, Sola Morena MD, Servicio de Farmacia. Área Funcional de Gestión de Albacete.
*Hospital de Hellín

Objetivo: Determinar el porcentaje de prescripción de especialidades farmacéuticas calificadas como UTB (Utilidad Terapéutica Baja) en centros sociosanitarios y en un centro hospitalario.

Material y métodos: Estudio retrospectivo y observacional de 6 meses de duración (septiembre de 2008 a marzo de 2009), en el que se evaluaron todas las prescripciones correspondientes a 976 camas de 6 centros sociosanitarios y 536 camas de un centro hospitalario. Se seleccionaron como UTB aquellos principios activos (UTB1) y asociaciones (UTB2) descritas en el documento: "Utilidad terapéutica de los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Madrid: INSALUD, 2001".

Resultados: En centros sociosanitarios el total de unidades dispensadas fue de 1.749.710 de las cuales correspondieron a fármacos de UTB 176.441 (10,08%) y los importes económicos fueron 599.744,5 € totales y 20.959 € (3,49%) respectivamente. Los fármacos UTB más prescritos fueron: N-acetilcisteína (54.753), Diosmina (31.885), Trimetazidina (24.420), Asociación de Calcio + vitamina D (18.760), Dimeticona (12.920) y Acarbosa (9.810). En el centro hospitalario el total de unidades dispensadas fue de 1.439.597 de las cuales correspondieron a fármacos de UTB 17.559 (1,21%) y los importes económicos fueron 2.716.650 € totales y 11.112 € de fármacos UTB (0,4%). Los fármacos UTB más prescritos en el hospital fueron N-acetilcisteína (6.515), Mesna como mucolítico (4.586), Diosmina (1.538), Butilescopolamina + metamizol (1.221) y Estreptoquinasa + Estreptodornasa (1.209).

Conclusiones: En los centros sociosanitarios el porcentaje de prescripción de fármacos UTB es casi diez veces mayor que en el hospital y también sucede lo mismo con el importe económico. Ello demuestra que las Comisiones de Farmacia, guías farmacoterapéuticas y actividad diaria del farmacéutico, en el hospital, redundan en disminuir diez veces el consumo de fármacos UTB. Actualmente se está empezando a tomar estas medidas en centros sociosanitarios, pero la falta de medios humanos y el gran número de camas en estos centros supone una fuerte traba.