




ANÁLISIS DEL USO DE IVABRADINA EN PACIENTES CARDIOLÓGICOS

Montero Hernández, M; Pla Hernández, M.I; Font Noguera, I; Bosó Ribelles, V; San Martín Ciges, E; Martínez Cercós, L; Poveda Andrés, J.L.

Hospital Universitario La Fe. Valencia. España

Objetivo

El objetivo de nuestro estudio es analizar el uso clínico de ivabradina en la población cardiológica con respecto a la indicación aprobada en tratamiento sintomático de la angina de pecho estable crónica en pacientes con ritmo sinusal normal que presentan una contraindicación o intolerancia a beta-bloqueantes, y sus repercusiones.




Material y Métodos



Se han seleccionado los pacientes ingresados en cardiología con prescripción de ivabradina durante un trimestre (diciembre 2008-febrero 2009). Evaluando: características de la población, indicación, dosis, tratamientos concomitantes y efectos adversos.

Resultados

- ❖ En 22 pacientes en tratamiento con ivabradina: sexo (15 hombres y 9 mujeres), la edad de la población esta comprendida entre los 34 y los 93 años.
- ❖ 38% de los pacientes iniciaron tratamiento durante el ingreso hospitalario analizado.
- ❖ 25 % pacientes llevaron previamente B-bloqueantes y 38% asociaron b-bloqueantes e ivabradina.
- ❖ Sólo 1 paciente refiere efectos adversos retinianos transitorios.



Sólo 1 paciente Angina Estable



Conclusiones

El uso de ivabradina en la práctica clínica supera la indicación aprobada de angina estable, dado que los últimos estudios ya con resultados previos comunicados en congresos de cardiología avalan el uso de ivabradina en pacientes con patologías como: IAM, IC y otras anginas, incluso concomitantemente con beta-bloqueantes, tanto en perfil de seguridad como de eficacia. (estudios: BEAUTIFUL, SHIFT, VIVIF).