

MODIFICACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE FÁRMACOS ANTIRRETROVIRALES TRAS LA COMERCIALIZACIÓN DE UNA FORMA FARMACÉUTICA COMBINADA DE ADMINISTRACIÓN ÚNICA DIARIA


Gramage Caro T, Rodríguez Sagrado M.A., Pintor Recuenco R, Serna Pérez J, Bermejo Vicedo T.

Análisis farmacoeconómico de los cambios en la prescripción de tratamiento antirretroviral desde la comercialización de la forma farmacéutica combinada de tres principios activos en el mismo comprimido y de administración única diaria ATRIPLA® (emtricitabina/tenofovir/efavirenz).

Material y métodos:

- ➔ Estudio retrospectivo y descriptivo.
- ➔ Se identificaron en aplicación informática de dispensación de medicación a Pacientes Externos (Paciwin®) todos los pacientes en tratamiento con Atripla® a lo largo de seis meses, desde septiembre de 2008 hasta febrero de 2009.
- ➔ Se excluyeron los inicios de tratamiento antirretroviral; sólo se consideraron los pacientes con tratamientos previos.
- ➔ Se estudiaron las combinaciones de especialidades previas a la prescripción de Atripla®, y se recogió el número total de combinaciones, el número de pacientes en tratamiento con cada combinación, el número de tomas y de comprimidos diarios con el tratamiento previo y el coste/año de cada combinación. Estos datos se compararon con los relativos a la prescripción de Atripla®.
- ➔ También se revisaron las suspensiones de tratamiento con Atripla®, y se registraron las nuevas prescripciones de tratamiento.

Resultados:



PRINCIPALES TRATAMIENTOS*	%
Lamivudina 300 mg comp.	5,5
Efavirenz 600 mg comp.	
Tenofovir 245 mg comp.	3,8
Lamivudina 300 mg comp.	
Efavirenz 600 mg comp.	
Didadosina 400 mg caps.	2,7
Abacavir 600 mg / Lamivudina 300 mg comp.	
Efavirenz 600 mg comp.	2,7
Emtricitabina 200 mg / Tenofovir 245 mg comp.	
Nevirapina 200 mg comp.	2,2
Abacavir 300 mg / Lamivudina 150 mg / Zidovudina 300 mg comp.	

Conclusiones:

- ➔ La comercialización de una forma farmacéutica combinada de administración única diaria en la terapia anti-VIH, además de haber permitido disminuir el número de tomas diarias y el número de comprimidos al día, ha supuesto una pequeña disminución en el gasto anual.
- ➔ La asociación de emtricitabina/tenofovir/efavirenz en un único comprimido no sólo ha sustituido a la prescripción de estos tres principios activos por separado, sino que también ha desplazado la prescripción médica de otros regímenes de tratamiento habituales en la práctica clínica.