

ENFERMEDAD DE BEHCET. TRATAMIENTO CON INFLIXIMAB.

Gimeno M, Pardo MP, Marín C, Arenere M, Sagredo MA, Montis FJ.

Servicio de Farmacia Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa". Zaragoza

INTRODUCCIÓN:

La enfermedad de Behcet es una vasculitis de causa desconocida que puede afectar a casi cualquier parte del organismo. La respuesta inflamatoria se encuentra alterada de forma similar a la de las enfermedades autoinmunes. El uso de anti-TNF- α como infliximab se basa en que se han encontrado concentraciones elevadas de TNF- α intraoculares y en el suero de paciente con enfermedad de Behcet activa, además éste juega un papel fundamental en la patogénesis de la inflamación.

OBJETIVO:

Revisión de la enfermedad de Behcet y del tratamiento con Infliximab en pacientes tratados en nuestro hospital que no responden a terapia habitual.



MATERIAL Y MÉTODOS:

- **Población a estudio:** Pacientes con enfermedad de Behcet tratados con Infliximab como uso compasivo.
- **Tipo y periodo de estudio:** Retrospectivo, de enero de 2007 hasta febrero 2009.
- **Fuente de datos:** Historias clínicas y revisión bibliográfica en PubMed.
- **Datos recogidos:** Síntomas de la enfermedad, tratamiento anteriores, número de ciclos de Infliximab administrados, efectos adversos al infliximab, resultado del tratamiento evidenciado por la disminución de manifestaciones clínicas de la enfermedad y reducción o suspensión del tratamiento corticoide concomitante.



RESULTADO:

Variables demográficas	Dos hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 19 y 44 años.
Sintomatología	Aftas orales y genitales, uveítis, lesiones cutáneas o vasculitis cerebral. Dos casos fueron Neurobehcet
Tratamientos anteriores a Infliximab	Ciclosporina, azatioprina, corticoides y colchicina. *Además los dos pacientes con Neurobehcet se trataron con ciclofosfamida IV
Motivo inicio Infliximab	Reacciones adversas a tratamientos anteriores, falta de control de la enfermedad y aparición de recidivas.
Descripción tratamiento Infliximab	Se administraron de 5 a 17 ciclos por paciente con una dosis inicial de 5 mg/ Kg con una frecuencia de entre 6 y 10 semanas, tras la pauta de inicio habitual. Se aumentó la frecuencia en los pacientes con recidivas. Reducción pauta de corticoides en todos los pacientes y retirada en tres de ellos
RAM a Infliximab	Reacción infusional en el 2º ciclo de tratamiento administrado sin premedicación
Evolución	Se evidenció mejoría desde el primer ciclo de Infliximab en todos los casos En tres de los pacientes se observó remisión de los síntomas y reducción de las dosis de corticoides hasta suspensión. Continúan en tratamiento con Infliximab. El paciente restante, tras 17 ciclos de tratamiento se suspendió por recurrencia de las aftas. Se cambió el tratamiento a adalimumab como uso compasivo

CONCLUSIONES:

Cuando el tratamiento convencional para la enfermedad de Behcet no muestra eficacia, Infliximab tramitado por uso compasivo, puede ser una buena alternativa para este tipo de pacientes dada su eficacia y seguridad.