

INCORPORACIÓN DEL FARMACÉUTICO A LAS SESIONES CLÍNICAS DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA MÉDICA

Rodríguez Penín I, Afonso Afonso FJ, De la Cámara Gómez J, De Paz Arias L, Graña Suarez B, Pellón Augusto ML
Servicio de Farmacia. Hospital Arquitecto Marcide. Área Sanitaria de Ferrol



Describir las aportaciones realizadas por el farmacéutico tras su incorporación a la sesión semanal del servicio de oncología médica (SOM) para la discusión de la actitud terapéutica en las primeras consultas.

Estudio prospectivo de todos los casos clínicos discutidos en la sesión semanal del SOM.

Resumen historia clínica

- Edad, estado funcional y datos antropométricos.
- Antecedentes, historia familiar de cáncer y comorbilidades.
- Pruebas diagnósticas y complementarias.
- Juicio clínico y actitud terapéutica propuesta.

Actuación del Farmacéutico

- Resolver consultas
- Informes de uso compasivo
- Cumplimiento de protocolos
- Valoración de la idoneidad del régimen terapéutico
- Trámites administrativos en la prescripción



Tratamiento antineoplásico

Quimioterapia: 83%	Radioterapia
Tto hormonal	Cirugía

Unidad de cuidados paliativos: 14 pac.	Estudios adicionales para determinar la opción terapéutica de elección: 31 pac
Seguimiento sin tratamiento: 29 pac.	

Colorrectal: 69	Estómago: 19	Páncreas: 7
Mama: 66	Cabeza y cuello: 16	Otros: 66
Pulmón: 47	Origen desconocido: 8	

140 Pacientes enfermedad metastásica

FARMACÉUTIC@



Informe farmacoeconómico: tto de elección en adenocarcinoma de pulmón metastásico 1ª línea

Informes de uso compasivo (ver tabla inferior)

Información sobre medicamentos no incluidos en la guía: Panitumumab, everolimus y glutamina.

Proyecto de protocolo de soporte nutricional al paciente oncológico.

Paclitaxel-carboplatino	Cancer de vejiga, melanoma y Cabeza y cuello.
Folfox y folfiri	Cáncer gástrico
Gemcitabina	Tumor de vesícula y colorrectal
Everolimus	Tumor carcinoide
Paclitaxel	Tumor de canal anal
Bevacizumab	Cáncer de ovario, con docetaxel en cáncer de mama, con interferon en cáncer renal (3ª línea).

SE REVISARON CONJUNTAMENTE

- 3 Esquemas de tratamiento: 1ª línea de cáncer gástrico metastásico, 1ª línea de cáncer colorrectal metastásico y enfermedad trofoblástica gestacional.
- Valoración comparativa fluorouracilo versus capecitabina en cáncer colorrectal.
- Discusión de tratamientos alternativos por falta de evidencia o conveniencia en 8 casos.

- o La presencia del farmacéutico en la sesión de oncología médica facilita la resolución de diferentes cuestiones sobre medicamentos planteadas por el equipo médico e incrementa la información del farmacéutico sobre las decisiones clínicas.
- o La sesión conjunta constituye un foro de discusión de temas de interés común, promoción de la realización de protocolos terapéuticos y fomento de la colaboración docente e investigadora.