

EFECTIVIDAD DE APREPITANT EN PACIENTES REFRACTARIOS AL TRATAMIENTO ANTIEMÉTICO CONVENCIONAL

Autores: Oñate Muzás E, Tamayo Orbeago E, Asenjo Segovia S, Iruin Sanz A, Arrondo Velasco A, Larrayoz, Sola, B.

Servicio de Farmacia. Hospital de Navarra

Objetivos:

Valorar la efectividad de aprepitant en pacientes con regímenes de quimioterapia (QT) alta o moderadamente emetógena que no responden al tratamiento antiemético convencional.

Material y Métodos:


Estudio retrospectivo en el que se incluyeron pacientes que iniciaron tratamiento con aprepitant y que cumplimentaron la encuesta diseñada para evaluar la respuesta al tratamiento desde febrero del 2007 a febrero del 2009. El farmacéutico responsable de la Unidad de Atención Farmacéutica Ambulatoria dispensó el fármaco a cada paciente, proporcionándole información oral y escrita sobre el mismo, además de una encuesta por ciclo para así poder llevar a cabo el seguimiento de su eficacia.

Resultados:

Pacientes tratados con aprepitant: 22

Encuestas dispensadas: 52

Encuestas recogidas y valoradas: 25 (48%)



Conclusiones:

- Aprepitant es una alternativa eficaz para el control de los vómitos, como terapia de segunda línea en pacientes sometidos a QT altamente emetógena.
- Por el contrario no tiene un efecto objetivo en el control de las náuseas tanto agudas como retardadas.
- Estos resultados coinciden con los publicados en la bibliografía.
- Aprepitant no ha resultado eficaz en los pacientes tratados con QT moderadamente emetógena, aunque el número de pacientes tratados es anecdótico y sería necesario el seguimiento de una serie superior.