


UTILIZACIÓN DE IBRITUMOMAB TIUXETAN-ITRIO⁹⁰ (ZEVALÍN®) EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE LINFOMA NO HODGKIN FOLICULAR


González Paniagua, V; De la Nogal Fernández, B; Álamo González, O; Hermida Pérez, C; Machín Morón, MA; Cuevas Ruiz, B*. Servicio de Farmacia. *Servicio de Hematología. Hospital General Yagüe. Complejo Asistencial de Burgos. Burgos.

El Linfoma no Hodgking (LNH) folicular se puede considerar como una enfermedad crónica de larga duración, sin un tratamiento curativo. En pacientes en recaída se pueden considerar distintas opciones de tratamiento: Rituximab en mantenimiento, Fludarabina ó radioinmunoterapia.



INDICACIONES AUTORIZADAS EN SEPTIEMBRE DE 2009

- Ibritumomab Tiuxetan marcado con itrio-90 está indicado como tratamiento de consolidación después de la remisión de la inducción en pacientes con linfoma folicular no tratados anteriormente.
- Ibritumomab Tiuxetan marcado con itrio-90 está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con LNH folicular de células B CD20+ en recaída o refractario a Rituximab.



TOLERANCIA:

- 86% de los pacientes presentaron **trombopenia** (3 de los cuales presentaron grado IV, siendo el nadir a las 4 semanas y la recuperación a las 8 semanas).
- 30% de los pacientes presentaron **anemia**.
- 57% presentaron **neutropenia**, requiriéndose factores estimulantes de colonias en un único paciente.

CONCLUSIONES:

- El tratamiento con Ibritumomab Tiuxetan es una **alternativa terapéutica** en pacientes diagnosticados de LNH folicular que hayan recidivado a tratamientos anteriores.
- La **eficacia** (valorándose como tiempo hasta la progresión) en nuestra serie de 7 pacientes ha sido de un 43%, siendo la frecuencia de trombopenia grado IV del 43%.