

# TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y/O DEPRESIÓN EN PACIENTES EN TRATAMIENTO CON PEGINTRON®: DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN

Abeijón Vázquez A; Gómez Rivas P; Obaldia Alaña C; Rubio Lopez MC; Santos del Pozo R; Esteban Sanchez M  
Servicio de Farmacia Hospital San Pedro. Logroño

## Objetivos:

### Objetivo principal:

Determinar que porcentaje de pacientes tratados con Pegintron® sufren trastornos de ansiedad (A) y/o depresión (D).

### Objetivos secundarios:

Cuantificar los pacientes con antecedentes de A y/o D

Cuantificar los pacientes tratados con ansiolíticos (ANS y/o hipnóticos)


Cuantificar los pacientes que han presentado alguna idea suicida a lo largo del tratamiento

## Método:

Estudio prospectivo y observacional de 2.5 meses de duración. La población a estudio incluyó a todos los pacientes en tratamiento con Pegintron® que acudieron a recoger medicación a la consulta externa de farmacia del 15 de enero al 31 de marzo de 2009.

Para medir el grado de A y D se utilizó la escala de ansiedad y depresión hospitalaria (HAD) de Zimong y Snaith. También se recogieron datos sobre: tipo de visita (inicio o continuación), sexo, edad, coinfección con VIH, adicciones (alcohol y/o drogas), antecedentes de A y/o D y tratamientos ansiolíticos o antidepresivos recibidos.

## Resultados:



## Conclusiones:

- La **prevalencia** de padecer **A y/o D** fue de un **33,3%**, cifra que aumenta hasta un **60%** si consideramos los **pacientes con sintomatología dudosa**.
- El **70%** de los pacientes con A y/o D había tenido **episodios ansioso y/o depresivos anteriormente**.
- Solo un **60%** de los pacientes con A y/o D **recibían tratamiento**.

Sería apropiado **incluir** en el **protocolo** de tratamiento de VHC, controles periódicos para **detectar** este tipo de **problemas neuropsiquiátricos**, que tienden a repercutir negativamente en el resultado final del tratamiento.