


Martínez Sánchez E\*, Orpez Ramirez A, Prado Mel E, Espinosa Bosch M, Santos Ramos B, Bautista Paloma FJ.  
Servicio de Farmacia. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)  
\*Hospital General Yagüe (Burgos)


**OBJETIVO** ⇒ mejorar la adecuación de la prescripción de la profilaxis tromboembólica en pacientes médicos en un hospital terciario.

## MATERIAL Y MÉTODOS:

- ⇒ Guía PRETEMED (estándar de adecuación)
- ⇒ Selección de pacientes de medicina interna y oncología (2 meses)
- ⇒ Hoja de recogida de datos
- ⇒ Recomendación:
  - \* pacientes en tratamiento con enoxaparina 20mg y  $Clcr > 30$  ml/minuto ⇒ ↑ D a 40mg
  - \* Pacientes sin profilaxis antitrombótica ⇒ CÁLCULO DEL RIESGO AJUSTADO (RA)



## RESULTADOS ⇒



**CONCLUSIONES** ⇒ Hemos conseguido una herramienta útil que nos permite identificar pacientes con riesgo de sufrir procesos tromboembólicos e intervenir adecuadamente.