


CONSUMO DE RANIBIZUMAB EN LA DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD

Camacho González de Aguilar M, Celemín Viñuela ML, Miranda Romero P, Lamela Piteira CJ, Ordóñez Fernández L y Alkassam Martínez M.
 Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

✓ Analizar el consumo de ranibizumab en pacientes con DMAE neovascular en el Servicio de Farmacia de nuestro hospital.

- ✓ Estudio retrospectivo
- ✓ 192 pacientes que presentaban DMAE neovascular en uno o ambos ojos
- ✓ Periodo de estudio: agosto de 2007 a febrero del año 2009
- ✓ Dosis: 0.5 mg/0.05 ml de ranibizumab intravítrea
- ✓ Variables registradas:
 - ♠ sexo
 - ♠ n° dosis administradas
 - ♠ edad
 - ♠ fecha de inicio del tratamiento
 - ♠ MAVC al inicio de tratamiento
 - ♠ fecha de administración de cada dosis

* Para el estudio estadístico los datos de cada ojo se consideraron de forma individualizada, como si de un paciente aislado se tratara.



✓ Dada la elevada incidencia de esta enfermedad, la diferente respuesta al tratamiento y los múltiples pacientes que necesitan numerosas dosis, proponemos que se debería elaborar un protocolo para el tratamiento de la DMAE neovascular, en el que se recoja cuándo se considera fracaso terapéutico, así como el tratamiento alternativo en casos refractarios a ranibizumab.