



RESPUESTA A MARAVIROC EN ADULTOS VIH CON FRACASO TERAPEUTICO.

Saliente Callén, S; García Coronel, M; López López, MP; García Simón, MS; Mira Sirvent, MC; Alonso Sánchez, A.

Servicio Farmacia. H. Santa María del Rosell.

OBJETIVO : Valorar la respuesta virológica e inmunológica en pacientes con infección por VIH en fracaso terapéutico y que son tratados con maraviroc.

MATERIAL Y MÉTODOS:



- Estudio retrospectivo y observacional de los pacientes que reciben tratamiento con maraviroc durante al menos 3 meses entre marzo de 2008 y marzo de 2009.
- Se revisaron las historias clínicas, los datos analíticos y las dispensaciones de antirretrovirales para estudiar edad, sexo, estadio clínico y coinfección por virus VHC y/o VHB, TARV que acompaña al maraviroc, motivo del cambio a este fármaco, antirretrovirales recibidos previamente, recuento de CD4 y carga viral.

RESULTADOS :

- Se incluyen 8 pacientes, edad media de 42 años (rango 29-60), 7 de ellos son hombres.
- El estadio más frecuente es el C3 (62%), y 3 de los pacientes presentaban coinfección por VHC.

• La causa por la que se decidió iniciar tratamiento con un inhibidor del co-receptor CCR5 fue fracaso terapéutico debido a múltiples resistencias y/o intolerancia.

• La CV media al inicio del tratamiento fue de 100824 copias/ml (rango 2541 - 500000)



CONCLUSIONES :

- La introducción del maraviroc en el TARV de los pacientes que se encuentran en fracaso terapéutico resulta eficaz para obtener mejoría tanto inmunológica como virológica.
- La reciente incorporación en el arsenal terapéutico de fármacos que actúan sobre nuevas dianas farmacológicas ofrece otras posibilidades en el tratamiento de pacientes que presentan intolerancia o multirresistencias al TARV clásico.