


CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN EN PACIENTES QUIRÚRGICOS.

Vicente Sánchez MP, Tejada González P, Laguna Ceba E, Prieto Utiel E, Arteta Jiménez M.
Servicio Farmacia. Hospital Universitario de Getafe, Madrid


OBJETIVO

Evaluar la concordancia entre el tratamiento crónico ambulatorio y el prescrito durante el ingreso hospitalario y analizar los resultados de la implantación de un protocolo de conciliación de la medicación en pacientes de servicios quirúrgicos en un hospital general y de tercer grado de complejidad.

MÉTODO



RESULTADOS



- ✓ Se estudiaron 67 pacientes que tenían como tratamiento crónico un total de 358 medicamentos.
- ✓ La omisión fue injustificada en el 27,62% (n=29) del total de omisiones (n=105)
- ✓ El grado de aceptación médica en los casos de omisión injustificada fue del 39,9%.

CONCLUSIONES

- ✓ Existe un alto porcentaje de discordancia entre la medicación crónica y la prescrita durante el ingreso.
- ✓ Los grupos terapéuticos en los que se produce mayor discrepancia no justificada son el C (aparato cardiovascular), el N (sistema nervioso) y el B (sangre y líquidos corporales).
- ✓ La intervención del farmacéutico en este estudio, a través de la conciliación de la medicación, supone la reintroducción de un 40% de la medicación suspendida durante el ingreso de forma no justificada.
- ✓ La historia clínica informatizada y la prescripción electrónica facilitan la detección de errores y la intervención farmacéutica a tiempo real, mejorando el cumplimiento farmacoterapéutico durante la estancia hospitalaria.