

PREVALENCIA DE HIPERGLUCEMIA EN PACIENTES CON NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL

Isidoro García M, Calzón Blanco C, Mejuto Pérez del Molino B, Fernández López de Vicuña EM, Ayastuy Ruiz A, Tembrás Martínez S.
Servicio de Farmacia. Hospital de Cabueñes. Gijón

OBJETIVO:

Analizar la prevalencia de hiperglucemia (HPG) y las necesidades de aporte de insulina en pacientes ingresados con nutrición parenteral total (NPT).





MATERIAL Y MÉTODO:

- Revisión retrospectiva
- Período de estudio: Noviembre-08 y Marzo-09
- Pacientes incluidos: Ingresados con NPT
- Exclusión de: pacientes de UVI

• Variables recogidas

- Datos demográficos
- Días con NPT
- Días con glucemias >150 mg/dL
- Preexistencia de diabetes
- Picos febriles
- Necesidad de insulina
- Motivo de retirada de NPT

RESULTADOS:



CONCLUSIONES:

La aparición de glucemias mayores de 150 mg/dL es mayor que la referida en la bibliografía.

También se observa una relación entre la presencia de diabetes y picos febriles con la aparición de HPG durante el tratamiento con NPT.