

REVISIÓN DEL USO DE MICOFENOLATO DE MOFETILO EN INDICACIONES "OFF LABEL" EN UN HOSPITAL GENERAL.

Martín Andrés P, Lacalle Fabo E, Aranguren Ruiz I, López Mancha MT, Ferro Uriguen A, Elizondo Armendariz JJ

Hospital Virgen de Camino, Pamplona, Navarra

Métodos:

Objetivos:

- Revisar las indicaciones "off label" de MMF.
- Describir las condiciones de uso
- Evaluar su utilidad terapéutica y seguridad.

Estudio observacional retrospectivo del uso de MMF desde enero de 2007 hasta abril de 2009.

Los datos se han recogido de solicitudes de uso compasivo, del Programa informático de dispensación a pacientes externos y de la Historia Clínica Informatizada


Resultados:

16 pacientes, 75% (12) mujeres, de edad media 37 (8-54) años. Dosis de MMF entre 0.5 a 2 gr/día. Tiempo medio de tratamiento 12(1-24) meses. No efectos adversos relevantes durante el tratamiento.

Conclusiones:

- MMF se utiliza como uso compasivo en patologías de carácter autoinmune, como alternativa terapéutica en pacientes refractarios a tratamiento convencional.
- En esta serie de pacientes, se han obtenido buenos resultados en el control de la patología de base y no se han observado efectos adversos relevantes.

DIAGNOSTICOS



■ LES	■ GLOMERULONEFRITIS DE CAMBIOS MINIMOS
□ GLOMERULONEFRITIS MEMBRANOSA	□ GRANULOMATOSIS DE WEGENER
■ SINDROME DE BERGER	■ POLIQUISTOSIS RENAL
■ PANARTERITIS NODOSA	□ POLIMOSITIS

EVOLUCION CLINICA

