


# DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD: EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO CON ANTIANGIOGÉNICOS




Viñuales Armengol C, Abad Bañuelos B, Amador Rodríguez MP, Burdeus Gómez R\*.  
 Servicio de Farmacia, Hospital General San Jorge (Huesca)  
 \* Servicio de Oftalmología, Hospital General San Jorge (Huesca)

**OBJETIVO:** Evaluar la utilización de antiangiogénicos en el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) exudativa y estudiar su eficacia y seguridad en esta patología

**MATERIAL Y METODOS:** Estudio descriptivo y retrospectivo de los pacientes con DMAE exudativa tratados con pegaptanib o ranibizumab desde enero de 2008 a febrero de 2009. Los datos se obtuvieron del programa informático de preparación de medicamentos del Servicio de Farmacia y de la revisión de las historias clínicas. Se estudian:


•AV (test de la E de Snellen)



•Angiografía fluoresceínica




•Tomografía de coherencia óptica




## RESULTADOS:


% DE PACIENTES EVALUADOS




DOSIS ADMINISTRADAS



AGUDEZA VISUAL (AV)



SIGNOS EXUDATIVOS



## CONCLUSIONES

- 1- La eficacia tras la administración de tres dosis de antiangiogénico es limitada, tanto si se valora la mejora en AV como en signos de exudación.
- 2- Se debería ampliar el periodo de estudio para determinar si la administración de más ciclos de tratamiento lograría mejorar estos resultados.
- 3- Dado el alto coste y la eficacia limitada del tratamiento, sería necesario establecer criterios de selección de los pacientes adecuados.
- 4- La inyección intravítrea de pegaptanib y ranibizumab se considera segura.