



USO DE BEVACIZUMAB EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE CARCINOMA COLORECTAL METASTÁSICO

Serrano MC, Varela I, Agustín MJ, Soler E, Cañameres I, Abad MR
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

OBJETIVOS

Analizar la efectividad y seguridad de bevacizumab (BVZ) en pacientes diagnosticados de cáncer colorectal metastásico (CCRm).

MÉTODO

Estudio observacional y retrospectivo en que se analizan pacientes con CCRm tratados con BVZ durante el primer semestre de 2007 y con seguimiento clínico hasta marzo de 2009.

Variables analizadas: - Sexo y edad al diagnóstico - Localización de metástasis
- Tiempo desde el diagnóstico hasta el inicio de tratamiento con BVZ
- Líneas de tratamiento previas a tratamiento con BVZ



Variables de respuesta: - Tasa de respuesta - Mediana de supervivencia libre de progresión (SLP)

Variables de seguridad: - Efectos adversos y gravedad - Retrasos de tratamiento y disminución de dosis

RESULTADOS

Edad al diagnóstico enf. metastásica	60 años (38-76)
Tiempo diagnóstico-inicio tto con BVZ	36 semanas (1-270)
Líneas previas al tto con BVZ	2 líneas (0-4)
Pacientes tratados con radioterapia	34,6 %
Pacientes recibieron BVZ en 1ª línea	27%
Mediana ciclos con BVZ	18 ciclos (2-39)

26 pacientes, 16 hombres



- 50% pacientes continuaron con BVZ en 2ª línea
- 27% llevó una 3ª línea con BVZ

VARIABLES DE RESPUESTA		
TASA DE RESPUESTA	Respuesta parcial	Enfermedad estable
	33,3%	66,7%
SLP	12,5 meses (4-25)	
% RESCATES CIRUGÍA METASTASIS	26,9% pacientes	

VARIABLES SEGURIDAD			
	GRADO 1-2	GRADO 3-4	REQUERIMIENTO
Neutropenia	---	26,9 %	Epoetina
Anemia	26,9 %	---	
Nauseas/vóm.	50,0 %	---	Fact.estim. colonias
Diarrea	50,0 %	7,7 %	
Astenia	---	7,7 %	Retraso ciclos
Neuropatía	73,1 %	---	
Mucositis	61,5 %	---	↓ Dosis
HTA	24,0 %	8,0 %	

CONCLUSIONES

- El uso de BVZ en CCRm es efectivo acompañado de distintos regímenes de quimioterapia.
- Los agentes antiangiogénicos, aunque efectivos, presentan un perfil de efectos adversos que hay que considerar ante su utilización.
- El BVZ se mantiene en un porcentaje importante de pacientes cambiándose los agentes quimioterápicos asociados.