



EFECTOS ADVERSOS SECUNDARIOS A QUIMIOTERAPIA: ENTREVISTA CON EL PACIENTE

635

Sánchez Ruiz de Gordo M, Andrés Navarro N, Ruiz Martín de la Torre R,
Flor García A, Fraga Fuentes MD, Fernández-Corada Sánchez A.
S. de Farmacia, HG "La Mancha-Centro". Alcázar de San Juan. Ciudad Real.

OBJETIVOS

Estudiar las reacciones adversas (RAM) más frecuentes relacionadas con la quimioterapia mediante entrevista farmacéutico-paciente.


MATERIAL Y MÉTODOS

Durante su rotación por Oncología Médica, una farmacéutica residente realizó una breve entrevista con cada paciente onco-hematológico que acudió a recibir su tratamiento quimioterápico al Hospital de Día, durante octubre y noviembre de 2008.

Se diseñó una hoja normalizada donde se recogían los siguientes campos: datos del paciente, tratamiento en curso, posibles reacciones adversas (fiebre, diarrea, estreñimiento, mucositis, vómitos, fatiga, neuropatía y cualquier otro efecto distinto que el paciente asociara con su QT). Todas las RAM fueron clasificadas en cuatro grados: 0 (ausencia), 1 (leve), 2 (moderado) y 3 (grave).

RESULTADOS

Se realizaron 413 entrevistas a 173 pacientes onco-hematológicos. El 76% de los pacientes analizados sufrieron alguna RAM.



CONCLUSIONES

- Tres de cada cuatro pacientes onco-hematológicos sufre alguna RAM relacionada con la quimioterapia administrada. La mayoría de estas reacciones son de grado 1 (leve) y aunque no suponen un cambio en la vida diaria del paciente afectan a su calidad de vida.
- En la entrevista farmacéutico-paciente quedan reflejadas RAM leves que en muchas ocasiones pueden ser fácilmente solucionadas, aumentando la satisfacción del paciente respecto a la atención recibida en el hospital.
- La integración del farmacéutico en el servicio de oncología médica fomenta la comunicación entre facultativos y permite detectar RAM que pueden estar enmascaradas.