

ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DE NADROPARINA COMO PROFILAXIS DE LA TROMBOSIS VENOSA EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA



Vergniory Trueba OA, Serrano De Lucas L, Rodríguez Carrero R, Iglesias García MT.

Objetivo:

Determinar la adherencia al protocolo de profilaxis de trombosis venosa profunda (TVP) en los pacientes sometidos a cirugía ortopédica y traumatológica (COT) y analizar los eventos tromboembólicos y hemorrágicos derivados de su aplicación desde enero a diciembre del año 2008.

Material y Métodos:





Peso paciente	ml HBPM		
	12h PreIQ	12h PostIQ	>24h PostIQ
<70 Kg	0,3	0,3	0,4
70-100 Kg	0,3	0,3	0,6
>100 Kg	0,4	0,4	0,8

Resultados:



82% de los TRATAMIENTOS ANTIAGREGANTES previos a la IQ NO fueron reiniciados, SIN que existiera relación con EPISODIOS DE TROMBOSIS

57% **43%**
EDAD: mediana 68 años. Rango: 17-93



Conclusiones:

- ✓ Se confirma la efectividad del protocolo, la proporción de eventos tromboembólicos y hemorrágicos es inferior a lo revisado en la bibliografía.
- ✓ La adherencia al protocolo es adecuada en las IQ programadas, siendo baja en las urgentes.