

CARCINOMA DE VEJIGA METASTÁSICO: ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO

Varela I, Agustín MJ, Serrano N, Serrano MC, Palomo P, Idoipe A

Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza



OBJETIVO

Descripción de la efectividad y seguridad de los tratamientos utilizados en pacientes diagnosticados de cáncer de vejiga metastásico (CVM).

MATERIAL Y MÉTODO

-Estudio observacional retrospectivo
-Pacientes diagnosticados en 2007 (seguimiento hasta marzo 2009).

Variables Clínicas: sexo y tipo de esquema
Efectividad: respuesta global, supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia global (SG).
Seguridad: efectos adversos (EA).

RESULTADOS

27 pacientes: 21 hombres y 6 mujeres

EFECTIVIDAD

Línea	Esquema	Nº de Respuestas Globales				SLP Mediana (rango) (meses)
		RC	RP	PE	EE	
1ª	Carboplatino-Gemcitabina	4	6	8	1	6 (24-1)
	Gemcitabina-Paclitaxel	0	1	0	0	6*
	Cisplatino-Gemcitabina	1	1	2	0	4 (0-8)
	Carboplatino-Paclitaxel	0	1	0	0	**
	TOTAL	5	9	10	1	5,5 (0-24)
2ª	Gemcitabina-Paclitaxel	0	2	4	0	1,5 (0-3)
	Carboplatino-Paclitaxel	0	2	0	0	4*
	Docetaxel	0	0	4	0	0
	Carboplatino	0	1	0	0	5*
	Citarabina-Paclitaxel	0	0	1	0	0
	Citarabina	0	0	1	0	0
	Radioterapia	0	0	1	0	0
	TOTAL	0	5	11	0	3,5 (0-5)
3ª	Gemcitabina-Paclitaxel	0	0	1	0	0
	Carboplatino-Paclitaxel	0	0	1	0	0
	Docetaxel	0	1	4	0	8*
	Epirrubicina-Cisplatino-Capecitabina	0	0	1	0	0
	TOTAL	0	1	7	0	8
4ª	Cisplatino-Vinorelbina	0	0	1	0	0
	Doxorrubicina	0	0	1	0	0
	Epirrubicina-Oxaliplatino	0	1	0	0	7*
	TOTAL	0	1	2	0	7

RC: Respuesta completa. RP: Respuesta parcial. PE: Progresión de enfermedad. EE: enfermedad estable. *Resultado referido a un único paciente por lo que no se calcula la mediana de la SLP.

** Dato perdido.

Mediana de SG : 14,5 meses (3-32)

SEGURIDAD

EA: 64,8% pacientes

Efectos Adversos 1ª Línea



■ Alopecia	■ Náuseas	□ Astenia
□ Cefalea	■ Diarrea	□ Neutropenia
■ Anemia	□ Trombopenia	■ Leucopenia
■ Neurotoxicidad 1	■ Dolor	

CONCLUSIONES

- Los platinos y gemcitabina son los agentes quimioterápicos más utilizados en CVM.
- En 1ª línea se alcanzan RC en un porcentaje importante de pacientes, disminuyéndose la efectividad en líneas sucesivas.
- Los EA, aunque frecuentes, son principalmente de grado 1-2 por lo que los tratamientos son considerados seguros.