

ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE ATOSIBAN EN AMENAZA DE PARTO PREMATURO.

Martín Andrés P, Aranguren Ruiz I, Lacalle Fabo E, Ferro Uriguen A, López Mancha MT, Elizondo Armendáriz JJ.

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. Navarra

Métodos:

Objetivos:

Analizar las condiciones de uso de atosibán en un hospital general.

Estudio observacional durante un mes.


Se revisaron las historias clínicas informatizadas de las gestantes que ingresaron en la unidad de obstetricia-ginecología con diagnóstico de APP.

Se recogieron datos de edad, semana de gestación, agente tocolítico utilizado, evolución y fecha de parto.

Resultados:


18 mujeres. Edad media: 29 (18-38) años. Edad gestacional media: 29 (23-35) semanas.

TRATAMIENTO TOCOLITICO UTILIZADO




■ ATOSIBAN ■ NIFEDIPINO ■ ATOSIBAN + NIFEDIPINO

La duración del tratamiento en mantenimiento fue de 23 (2-72 días).



EVOLUCION CLINICA EN EL PERIODO ESTUDIADO



El retraso medio en el parto fue de 27 días (1-72).

Conclusiones:

Se utilizó atosibán como tratamiento tocolítico solo o en combinación con nifedipino en el 78.5% de los casos.

En el 73%, se prolongó el tratamiento con atosibán más de 48 horas

En el 20% de las pacientes, se administró tratamiento tocolítico innecesariamente.