

QUIMIOTERAPIA INTRAVENOSA EN LA FASE FINAL DE LA VIDA

Martín Prado, S.; Sánchez Nevado, B.; Goitia Rubio, V.; García Albás, J.J.; Guisasola Ron, L.; Martínez Martínez, C. Servicio de Farmacia. Hospital Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz

Objetivos

Analizar la utilización de pautas de quimioterapia intravenosa en pacientes oncológicos en sus últimos días de vida y determinar la proximidad de estos tratamientos a la fecha de su muerte.



Métodos

Estudio retrospectivo observacional en el que se han incluido todos los pacientes pertenecientes al servicio de Oncología que fallecieron en nuestro hospital durante el año 2008. Las fuentes de información utilizadas fueron: a)ExploGRD para la obtención de altas e informes estadísticos b)Oncofar® 4.0. para el análisis de datos antropométricos, tipo de tumor y pautas de quimioterapia recibidas c)Revisión de historia clínica informatizada. Se recogieron para cada paciente datos demográficos, clínicos y fecha de última quimioterapia intravenosa. Una limitación de nuestro trabajo fue que no se contemplaron los pacientes con pautas de quimioterapia oral, ni aquellos que fallecieron fuera de nuestro hospital.

Resultados

203 pacientes oncológicos (76 mujeres) fallecieron en el año 2008 en nuestro hospital. De ellos, 40 pacientes no recibieron quimioterapia intravenosa. De los 163 pacientes que recibieron QT intravenosa, a un 84,7%(138) se les administró la última sesión de quimio en los últimos 6 meses de vida, a un 68,7%(112) en los últimos tres meses, a un 34,9%(57) en el último mes y a un 3,7%(6) en su última semana de vida.

Nº de pacientes con QT intravenosa	163
Edad de los pacientes con QT intravenosa	<ul style="list-style-type: none"> • 90 pac. < de 65 años • 73 pac. > de 65 años
Tumores con mayor nº de fallecidos	<ul style="list-style-type: none"> • Pulmón no microcítico (41) • Cáncer colorrectal (33) • Tumor de mama (18)
Último esquema de QT	<ul style="list-style-type: none"> • Carboplatino con distintas combinaciones (33) • Docetaxel monoterapia o tras FEC (22) • PFL (23)



Conclusiones

En nuestro hospital el porcentaje de pacientes con quimioterapia intravenosa en los últimos meses de vida es mayor que en otros estudios similares. Esto puede ser debido en parte a las limitaciones ya comentadas y a las diferentes prestaciones de nuestro sistema sanitario. Cabe destacar que un tercio de estos pacientes recibió quimioterapia intravenosa en el último mes de vida.

Deberíamos investigar si la juventud del paciente, el beneficio en la supervivencia o la mejoría en la calidad de vida del paciente son factores que favorecen la decisión de recibir quimioterapia hasta los últimos días de vida. Aunque intentar valorar la relación entre beneficio y toxicidad en estos tratamientos es difícil.