

EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE TRASTUZUMAB EN CÁNCER DE MAMA PRECOZ

Domínguez V, Romero MM, Sanchez R, Barrera M, Gonzalez L, Sánchez E.

Servicio de Farmacia Hospitalaria.
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva



Área Hospitalaria
Juan Ramón Jiménez

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ



JUNTA DE ANDALUCÍA

Servicio Andaluz de Salud

CONSEJERÍA DE SALUD



Objetivo


- Evaluar la efectividad y seguridad de trastuzumab en el tratamiento del cáncer de mama precoz.

Método


- Estudio observacional retrospectivo.
- Elaboración de un formulario de recogida de datos.
- La efectividad se evaluó según los ensayos pivotales.
- La seguridad se valoró según los criterios NCI-CTC. Se aplicó el algoritmo de causalidad de Karch y Lasagna modificado.

Resultado

- Se incluyeron dieciocho pacientes. La mediana de edad fue 53 ± 7.39 años. Al inicio del tratamiento citostático el PS fue de 1 en tres pacientes y de 0 en el resto. Dos presentaban estadio I al inicio del tratamiento, 5 estadio IIA, 5 estadio IIB, 6 estadio IIIA y 2 estadio IIIB. Como tratamiento quimioterápico adyuvante: 6 con FEC (uno de ellos se suspende por toxicidad y se cambia por docetaxel), 7 con TEC, 3 con EC, 1 paclitaxel y 1 en monoterapia. Ocho han tenido terapia hormonal adyuvante. El número de ciclos recibidos fue de 34 en 2 pacientes y 17 en 10 pacientes. Dos suspendieron por RAM: uno al tercer ciclo y otro al decimoquinto; 1 suspendió por progresión al decimotercero y 3 continúan en tratamiento.



- En 13 pacientes se pudo evaluar la respuesta: 12 presentaron respuesta completa y 1 progresión. El tanto por ciento de pacientes con recurrencia tras un año de seguimiento fue de 5.55%, y la supervivencia global fue del 100%.



- No existieron episodios de RAM de grado 3. Las RAM de grado 2 fueron: náuseas (1 paciente, causalidad probable (P)), astenia (1 paciente causalidad P), gastroenteritis aguda (1 paciente causalidad P). La RAM más grave encontrada fue cardiotoxicidad en 2 pacientes que obligó a suspender el tratamiento, en uno de ellos fue causalidad condicional y el otro P.

Conclusiones

- ➔ La utilización de trastuzumab en cáncer de mama precoz en nuestro hospital se ajusta a lo descrito en ficha técnica.
- ➔ Los resultados de efectividad medidos como tanto por ciento de pacientes con recurrencia tras un año de seguimiento son inferiores a los descritos en el ensayo pivotal (5.55 vs 7.5%) y el porcentaje de supervivencia global fue superior (100 vs 96%).
- ➔ El perfil de reacciones adversas es el que se describe en la bibliografía.