

SEGUIMIENTO DE LA DISPENSACIÓN DE FARMACOS MODIFICADORES DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DESDE LA CONSULTA DE PACIENTES AMBULATORIOS.

Martín Andrés P, Aranguren Ruiz I, Ferro Uriguen A, Mancha López MT, Carrasco del Amo ME, Nagore Indurain C.

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.Navarra

Objetivos:

Describir los cambios de tratamiento en pacientes con esclerosis múltiple observados en la consulta de pacientes ambulatorios.
Determinar cuál es el tratamiento más utilizado y el porcentaje de reacciones adversas observadas

Métodos:

Estudio observacional retrospectivo de las dispensaciones de fármacos modificadores del curso de la EM desde Enero de 2007 hasta Abril de 2009


DISTRIBUCION DE CAMBIOS DE TRATAMIENTO



Resultados:

64 pacientes. Sexo: 68.7% (44 mujeres). Edad (media, rango): 39 (23-68) años. Tipo de EM: 50 pacientes (78%) forma recidivante-remitente y 14 pacientes (22%) forma secundariamente progresiva.

DISTRIBUCION DE TRATAMIENTOS



■ BATAFERON	■ COPAXONE	□ AVONEX
□ REBIF 22	■ REBIF 44	■ TYSABRI
■ IMUREL	□ SIN TRATAMIENTO	

Conclusiones:

Tratamiento mayoritario: Betaferon® (37,5%).
El 40% de las modificaciones de tratamiento, han sido a Tysabri®, el 20% a Copaxone®, el 13,3 % a Betaferon®, el 13,3% a Imurel®, el 6,7% a Avonex®, y el 6,7% a Rebif®. En general, estos tratamientos son bien tolerados, observandose reacciones adversas en el 3,1% de los pacientes