



ANALISIS DEL USO COMPASIVO DE PEGAPTINIB INTRAOCULAR.

Bejar Riquelme A, Vera Meseguer IB, Alonso Herreros JM, Iniesta Navalón C, Franco Miguel J, Antequera Lardón M^aT

OBJETIVOS:

Analizar el uso compasivo de pegaptinib intraocular utilizado en un hospital general universitario durante un año.

MATERIAL Y METODOS:

Para identificar a los pacientes se emplearon los registros de tramitación de usos compasivos y dispensación de pacientes del año 2008. Para analizar los resultados obtenidos con el tratamiento se obtuvieron los resultados de las exploraciones realizadas de la historia clínica digitalizada.

RESULTADOS

Retinopatía diabética				
Pac	Agudeza visual	Espesor retina	Zona mácula edematizada	
1	+	-	-	
2	+	-	-	
3	+	+	-	
4	- (tras un año de tratamiento)	+	+	Triamcinolona intravitrea, y vitrectomia sin mejora
5	+ (De 0.2 a 0.3 tras un año de tratamiento)	+	-	Triamcinolona intravitrea, y vitrectomia Agudeza visual final 0.7

Trombosis Vena Retiniana				
Pac	Agudeza visual	Espesor retina	Zona mácula edematizada	
1	+	-	-	8 meses de tratamiento
2	+	-	-	
3	-	+	+	5 meses de tratamientos. Vitrectomia sin mejora

CONCLUSIONES

1. 1 Parece haber cierta utilidad del pegaptinib en la trombosis de la vena retiniana, y en la retinopatía diabética.
2. 2 El bajo número de pacientes tratados impide llegar a conclusiones estadísticamente significativas,
3. 3 Tampoco es posible comparar estos resultados con los obtenidos con otros fármacos, con indicaciones similares como el bevacizumab o la triamcinolona.
4. 4 Dado el coste económico de estos fármacos, y la gravedad de las patologías en las que se utilizan son necesarios estudios comparativos directos entre los diversas terapias antiangiogénicas.