

ANÁLISIS DE LA DISPENSACIÓN DE FÁRMACOS BLOQUEANTES DEL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL



Cortés de Miguel S; Dávila-Fajardo C; Rodríguez Lucas F; Valle-Díaz de la Guardia A; Ruiz Cruz C; Cabeza Barrera, J.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo de todas las dispensaciones de fármacos Anti-TNF a través del programa informático de pacientes externos y ambulatorios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008

- Número total de pacientes
- Distribución por Servicio
- Distribución por Diagnóstico
- Coste total de la terapia y coste medio por paciente.






- % Fármacos Anti- TNF dispensados según indicación
- % Fármacos Anti-TNF dispensados en indicaciones no autorizadas
- Modificaciones del tratamiento durante la terapia

RESULTADOS

NÚMERO TOTAL PACIENTES
240

COSTE TOTAL TERAPIA
2.450.550
COSTE MEDIO/PACIENTE
10.210,62



Sind. Behcet 40% Panuveítis 11,43%



USOS COMPASIVOS

CONCLUSIONES

El DIAGNÓSTICO más frecuente dentro de la terapia con fármacos Anti-TNF ➔ **Artritis Reumatoide > Espondilitis Anquilosante > Psoriasis.**

Los fármacos Anti-TNF más frecuentemente dispensados ➔ **ETANERCEPT: en Artritis Reumatoide, Artropatía Psoriásica y Psoriasis; ADALIMUMAB INFLIXIMAB en Espondilitis Anquilosante** y por último, **INFLIXIMAB en EII.**

El NÚMERO DE PACIENTES EN INDICACIONES NO AUTORIZADAS supone un **12,73%** del total de pacientes con terapia Anti-TNF, siendo **ADALIMUMAB** el fármaco que más se ha dispensado.