

TOPOTECAN ORAL: NUEVA ALTERNATIVA TERAPEUTICA

López-Vizcaíno Castro A., Iglesias Santamaría A., Gulín Dávila J, Fernández Ribeiro F., González Colominas E.

Servicio de Farmacia - Complejo Hospitalario Xeral-Calde

OBJETIVO

Analizar la prescripción de topotecan oral en nuestro hospital

MATERIAL Y MÉTODO


Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo del 100% de prescripciones de topotecan oral desde su comercialización hasta Abril 2009.

Fuentes: Programas Silicon® y Oncofarm®, historias clínicas.

RESULTADOS


N=6 pacientes (59 años edad media)
Performance Status(0-2)

Pacientes




- Carcinoma de Ovario Estadío IV (No indicado según ficha técnica). [Mujeres]
- Carcinoma Microcítico de Pulmón Estadío IV. [Hombres]

Pauta inicial Topotecan Oral




- 2,3 mg/m²/día
 - 1,8 mg/m²/día(*)
- (*) Dosis inicial no según ficha técnica

Línea de Tratamiento con topotecan oral




- Segunda Línea
- Tercera Línea
- Cuarta Línea

Evolución



- Exitus 1er Mes Tratamiento
- Reducción 20-25% Dosis
- Cambio de Tratamiento
- Sin incidencias

Toxicidades



- Anemia y Astenia G2
- Neutropenia G3
- Diarrea G1
- Vómitos G1
- Trombopenia G1

CONCLUSIONES

El 33% de las prescripciones de topotecan oral no se realizaron de acuerdo con la indicación en ficha técnica.

Las reacciones adversas fueron leve-moderadas, sólo hubo que retrasar el tratamiento en una ocasión y en ningún caso suspenderlo.

Su administración oral y fuera del ámbito hospitalario unido a un buen perfil seguridad/tolerancia, supone una ventaja frente a su alternativa I.V.