

ESTUDIO DEL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON HEPATITIS C CRÓNICA: EFICACIA Y EFECTOS ADVERSOS.

Molina Guillén P, Sánchez Catalicio MM, Llopis Fernández M, Arroyo Collados V, Plaza Anierte J, Espuny Miró A
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia

Objetivo

Evaluar la eficacia del tratamiento frente al virus de la hepatitis C (VHC) y analizar las causas del abandono del tratamiento.


Material y Métodos

- Estudio observacional retrospectivo de pacientes con hepatitis C crónica que iniciaron tratamiento en el año 2007 en nuestro hospital.
- Los datos se obtuvieron mediante la aplicación informática SAVAC y el registro de dispensaciones de la unidad de pacientes externos. Los resultados de respuesta viral, reacciones adversas y analíticas se completaron con las historias clínicas y el programa informático SELENE.
- La eficacia del tratamiento se midió con la respuesta viral sostenida (RVS) a los 6 meses de finalizar el tratamiento.


Resultados

Durante el periodo de estudio iniciaron tratamiento un total de 20 pacientes, 5 mujeres (25%) y 15 hombres (75%), con una edad media de 39,3 (27-59) años.

Distribución por genotipos



Evolución durante el tratamiento peginterferón-ribavirina




Finalizan tratamiento 13 pacientes (65%)

Respuesta positiva 11 pacientes	RVS	6
	Recidivas	2
	Sin evaluar	3

No finalizan tratamiento 7 pacientes

Criterios facultativos (5)	Abandono (2)
Ineficacia	2
Efectos secundarios	2
Traslado de centro	1
Mala tolerancia	1
Desconocida	1

Principales reacciones adversas



Conclusiones

La respuesta positiva al tratamiento con ribavirina y peginterferón alfa-2^a ha sido de un 55%.

De los pacientes con VHC que finalizan el tratamiento un 46% consiguen una RVS.

Las reacciones adversas al tratamiento son muy frecuentes y a menudo son causa de abandono o modificación de la terapia farmacológica