

Quinta Reunión Anual del grupo:




ATENCIÓN FARMACÉUTICA
AL PACIENTE
ONCOHEMATOLÓGICO

PRURITO
PARANEOPLÁSICO
Marta Eguiluz Solana R3
Hospital Costa del Sol

Tratamiento

- **Enero 2005:** Mujer con adenopatías y prurito → LH Esclerosis Nodular IIB




Quinta Reunión Anual del grupo:



ATENCIÓN FARMACÉUTICA
AL PACIENTE ONCOHEMATOLÓGICO

Tratamiento



Quinta Reunión Anual del grupo:




ATENCIÓN FARMACÉUTICA
AL PACIENTE ONCOHEMATOLÓGICO

Prurito Paraneoplásico

“Reacción sistémica debida a la presencia de un tumor sólido o neoplasia hematológica”

- Precede al diagnóstico
- Agravamiento en los estadios avanzados
- Afecta al 30% pacientes LH
- Mayor frecuencia:
 - Miembros inferiores
 - Durante la noche



Quinta Reunión Anual del grupo:



ATENCIÓN FARMACÉUTICA
AL PACIENTE ONCOHEMATOLÓGICO

Manejo del Prurito

UpToDate®

Antihistamínicos H ₁	Glucocorticoides	IRSS	Gabapentinoides	Antagonista NK1	Otros Inmunosupresores	Antagonistas Receptor Opiode
<ul style="list-style-type: none">• Hidroxizina	<ul style="list-style-type: none">• Prednisona	<ul style="list-style-type: none">• Paroxetina• Fluvoxamina• Sertralina	<ul style="list-style-type: none">• Gabapentina• Pregabalina	<ul style="list-style-type: none">• Aprepitant	<ul style="list-style-type: none">• Talidomida	<ul style="list-style-type: none">• Naltrexona


Quinta Reunión Anual del grupo:



ATENCIÓN FARMACÉUTICA
AL PACIENTE ONCOHEMATOLÓGICO

Seguimiento del Caso

- Julio 2011:
 - Prurito intenso MMII
 - Lesiones post-rascado (85%)
 - Denudación Epidermis



Quinta Reunión Anual del grupo:



ATENCIÓN FARMACÉUTICA
AL PACIENTE ONCOHEMATOLÓGICO

Revisión Bibliográfica

Aprepitant against pruritus in patients with solid tumours

[Bruno Vincenzi](#) ✉, [Maria Elisabetta Fratto](#), [Daniele Santini](#) & [Giuseppe Tonini](#)

Effectiveness of aprepitant in patients with refractory pruritus secondary to Sézary syndrome

Iolanda Fernandes, MD, Centro Hospitalar do Porto, EPE - Hospital de Santo António, Porto, Portugal; Manuela Selores, MD, Centro Hospitalar do Porto, EPE - Hospital de Santo António, Porto, Portugal; Margarida Lima, PhD, Centro Hospitalar do Porto, EPE - Hospital de Santo António, Porto, Portugal; Rosário Alves, MD, Centro Hospitalar do Porto, EPE - Hospital de Santo António, Porto, Portugal; Tiago Torres, MD, Centro Hospitalar do Porto, EPE - Hospital de Santo António, Porto, Portugal

Targeting the Neurokinin Receptor 1 with Aprepitant: A Novel Antipruritic Strategy

Sonja Ständer*, Dorothee Siepmann, Ilka Herrgott, Cord Sunderkötter, Thomas A. Luger

Department of Dermatology, Neurodermatology and Competence Center Pruritus, University of Münster, Münster, Germany

Correspondence

Oral aprepitant in the therapy of refractory pruritus in erythrodermic cutaneous T-cell lymphoma

N. Booken, M. Heck, J.P. Nicolay, C.D. Klemke, S. Goerdts, J. Utikal

First published: 29 October 2010 | <https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2010.10108.x> | Citations: 12


Quinta Reunión Anual del grupo:



ATENCIÓN FARMACÉUTICA
AL PACIENTE ONCOHEMATOLÓGICO

Evolución del Caso

- Aprepitant 80mg/24 Horas
- Control del prurito → Mejora calidad de vida



Quinta Reunión Anual del grupo:



ATENCIÓN FARMACÉUTICA
AL PACIENTE ONCOHEMATOLÓGICO

Contribución del Farmacéutico

- Contacto frecuente con la paciente y su madre en consulta AF
 - Evolución del prurito a situación altamente incapacitante

- Actitud proactiva → Inicio Búsqueda Bibliográfica

- Equipo multidisciplinar con buena relación

- ✓ Reducción intensidad picor
- ✓ Reducción puntuación VAS

Quinta Reunión Anual del grupo:



ATENCIÓN FARMACÉUTICA
AL PACIENTE ONCOHEMATOLÓGICO

¡Gracias!

Quinta Reunión Anual del grupo:



ATENCIÓN FARMACÉUTICA
AL PACIENTE ONCOHEMATOLÓGICO