WEBINAR

III JORNADA ONCOFARMA

Actualización en Cáncer de Ovario

GEDEFO Centro-Canarias

ORGANIZA:

Nuestra experiencia:

Atención farmacéutica en cáncer de ovario

Ana María Iglesias Bolaños

Farmacéutica Oncología. BCOP.

Hospital Universitario
del Sureste

NUESTRA PACIENTE. Marzo 2015

- Paciente de 55 años
- G2C2. 2 hijos sanos
- No HTA. No DM. No DL
- Exfumadora desde hace 10 años con un índice acumulado de unos 10paquetes/año.
- Antecedentes: Padre con neo vesical. Hermana con déficit alfa-1-antitripsina con hepatopatía.
- **Deficit de alfa-1-antitripsina** sin afectación respiratoria ni hepática. En control de Digestivo hallazgo en ecografía de **ASCITIS** con imagen de **engrosamiento peritoneal**.
- Refiere molestias en HCD que atribuye a gases y estreñimiento de siempre.
- Elevación de marcador Ca 125 (356 U/ml). Sospecha de tumor maligno de origen ginecológico, se completa estudio con la realización de una laparoscopia diagnostica.

Carcinoma de Ovario. Tratamiento

- **Adenocarcinoma papilar seroso de ovario derecho moderadamente diferenciado (G2) con diseminación peritoneal con lesiones < 2 cm. Estadio IIIB**
- **ESQUEMA TRATAMIENTO. (Intención curativa)**

Quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC)

VALIDACIÓN FARMACÉUTICA

ORDEN DE ADMINISTRACIÓN

- PESO= 90 Kg
- TALLA =1,60 m
- SC= 1,92 m²
- IMC = 34,4 kg/m²
- Cr= 0,8 mg/Dl
- No IR. No IH.

OMS
SOBREPESO IMC ≥ 25 kg/m²
OBESIDAD IMC ≥ 30 kg/m²

La Familia. Fernando Botero

DOSIFICACIÓN DE LA QUIMIOTERAPIA EN EL PACIENTE OBESO

Contents lists available at ScienceDirect

Gynecologic Oncology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/ygyno

Impact of obesity on chemotherapy dosing for women with advanced stage serous ovarian cancer in the Australian Ovarian Cancer Study (AOCS)

George Au-Yeung^{a,*}, Penelope M. Webb^c, Anna DeFazio^d, Sian Fereday^e, Mathias Bressel^f, Linda Miles^g

^a Department of Medical Oncology, Peter MacCallum Cancer Centre, East Melbourne, Victoria, Australia

^b Sir Peter MacCallum Department of Oncology, University of Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia

^c Gynaecological Cancers Group, QIMR Berghofer Institute of Medical Research, Brisbane, Queensland, Australia

^d Department of Gynaecological Oncology and Westmead Institute for Cancer Research, University of Sydney at Westmead Millennium Institute, Westmead Hospital, NSW, Australia

^e Cancer Genomics Program, Peter MacCallum Cancer Centre, East Melbourne, Victoria, Australia

^f Centre for Biostatistics and Clinical Trials, Peter MacCallum Cancer Centre, East Melbourne, Victoria, Australia

- N= 333 pacientes:
 - 27% con sobrepeso
 - 21% con obesidad
 - 52% normopeso
- En el primer ciclo de tratamiento **66% de las pacientes con obesidad recibieron una dosis de carboplatino menor de la calculada, y hasta un 32% de las pacientes recibieron dosis sub-óptimas de paclitaxel.**
- En aquellos casos en los que recibían < 85% de la intensidad de dosis de carboplatino se observaba una disminución en la SLP respecto a las pacientes con peso normal que recibían > 85% de la intensidad de dosis (11 meses versus 15 meses).

ORGANIZA:

WEBINAR III JORNADA ONCOFARMA

Actualización en Cáncer de Ovario

DOSIFICACIÓN PACIENTE OBESO

- Práctica habitual en oncología:
 - Dosificar en función Peso ideal / Ajustado.
 - Máximo de SC = 2 m²
 - 40% pacientes obesos reciben dosis reducidas.
- Mayor mortalidad en pacientes obesos
 - Multifactorial
 - Reducciones de dosis (Tratamiento curativo)
- Revisión sistemática ensayos clínicos y estudios observacionales
- No hay evidencia de aumento de toxicidad si los citostáticos se dosifican en función del peso total.
- Hay datos que indican que las reducciones de dosis en pacientes obesos afectan a la SLE y a la SG.
- En pacientes con obesidad las dosis de quimioterapia se deben calcular en función del **peso total** sobre todo cuando el tratamiento tiene **intención curativa**.
- En caso de comorbilidades y toxicidad los ajustes de dosis se deben de realizar igual que en pacientes no obesos.
- La farmacocinética de algunos fármacos se puede ver afectada en pacientes obesos, pero los datos encontrados no justifican una reducción de dosis.

CONSULTA DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA

4º ciclo de QT NEOADYUVANTE se retrasa por Neutropenia (1300 Neutrófilos)

ENTREVISTA CLÍNICA:

PACIENTE CONSUMIDORA DE TERAPIAS ALTERNATIVAS

1. PRODUCTOS DE HERBOLARIOS:
EXTRACTO DE TÉ VERDE. 2 CAP/8 HORAS
2. INFUSIONES VARIAS: GRAVIOLA, ALOE VERA, MUERDAGO, TOMILLO,...
3. HONGOS ORIENTALES

SERVICIO DE FARMACIA

Tratamiento con FILGRASTIM

Información para el paciente

NOMBRE PACIENTE: _____ FECHA: _____

¿Para qué se utiliza?

Estimular la producción de glóbulos blancos (defensas) en el organismo. Se utiliza para prevenir o tratar la neutropenia (baja de glóbulos blancos) que puede producirse durante el tratamiento con quimioterapia. Mantenga siempre el mismo horario.

¿Cómo se administra?

Se administra (debajo de la piel). La administración de la inyección debe seguir los siguientes pasos: recargada fuera de la nevera, a temperatura ambiente, (protegida de la luz) cuidadosamente.

1- Con la jeringa apuntando hacia arriba y retire la cubierta de plástico de la aguja. Puede aparecer una pequeña burbuja de aire en la jeringa hasta que las burbujas vayan al final de la jeringa. Con la jeringa apuntando hacia arriba extraiga todo el aire de la jeringa empujando el émbolo.
4- Desinfecte la piel de la zona de inyección usando un algodón con alcohol y pellizque un área amplia de piel, sin apretar.
5- Con la otra mano, introduzca la aguja en toda su longitud formando un ángulo de 45°.

6- Tire ligeramente del émbolo para confirmar que no ha pinchado un vaso sanguíneo (si ve sangre en la jeringa comience de nuevo) e inyecte la dosis de forma lenta y constante manteniendo la piel pellizcada.
8- Al terminar la inyección, retire la aguja y suelte la piel.
9- Desechar la jeringa en contenedor amarillo.

Para cada administración, debe cambiar el lugar de inyección, alternando entre:
- abdomen, excepto el área alrededor del ombligo.
- parte delantera de los muslos

WEBINAR III JORNADA ONCOFARMA
Actualización en Cáncer de Ovario

INTERACCIÓN QUIMIOTERAPIA INTRAVENOSA CON TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS

ORIGINALES

Artículo bilingüe inglés/español

Complementary medicine use in cancer patients receiving intravenous antineoplastic treatment

Uso de medicina complementaria en pacientes oncológicos sometidos a tratamiento quimioterápico intravenoso

Regina Juanbeltz^{2,3}, María Dolores Pérez-Fernández², Blanka Tirapu⁴, Ruth Vera^{3,5}, Susana de la Cruz², María Teresa Sarobel³

¹Servicio de Farmacia Hospitalaria, Complejo Hospitalario de Navarra, ²CIBER Epidemiología y Salud Pública, ³Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra- IISNA, ⁴Servicio de Farmacia Hospitalaria, Hospital General Osasun, ⁵Servicio de Oncología Médica, Complejo Hospitalario de Navarra, Spain.

Autor para correspondencia

Correo electrónico:
regina.juanbeltz.zurbano@navarra.es
(Regina Juanbeltz)

Recibido el 11 de abril de 2017;
aceptado el 8 de mayo de 2017.
DOI: 10.7399/ih.10805

Abstract

Objective: Complementary and alternative medicine (CAM) use has grown considerably, although there is little research on the topic in Spain. The aim of this study was to determine the prevalence of complementary medicine use in adult cancer patients at the same time as they were receiving conventional treatment in a Spanish referral cancer centre.

Method: An observational, descriptive, cross-sectional study was conducted in the Ambulatory Treatment Unit during 2 consecutive weeks in March 2015. Adult patients who were receiving intravenous chemotherapy were included. Study variables were obtained from a questionnaire and medical records.

Results: 316 patients were included. 32.3% of the patients reported complementary medicine use during this period and 89% were ingesting products by mouth, herbs and natural products being the most commonly used. 81% of patients started to use complementary medicine after diagnosis, and family/friends were the main source of information. 65% of the patients reported improvements, especially in their physical and psychological well-being. Significant predictors of CAM use were female gender ($P=0.028$), younger age ($P<0.001$), and secondary education ($P=0.009$).

Conclusions: A large proportion of cancer patients receiving intravenous chemotherapy also use complementary medicine, which they mainly take by mouth. Due to the risk of chemotherapy-CAM interactions, it is important for health-professionals to keep abreast of research on this issue, in order to provide advice on its potential benefits and risks.

Resumen

Objetivo: La popularidad de la medicina alternativa y complementaria entre los pacientes oncológicos ha incrementado, pero aún se dispone de poca información acerca de su empleo en España. El objetivo principal de este estudio fue determinar la prevalencia del uso de medicina complementaria en pacientes oncológicos adultos que reciben tratamiento en un centro autonómico español de referencia.

Método: Estudio observacional, descriptivo y transversal llevado a cabo en un Hospital de Día de oncología durante 2 semanas de marzo de 2015. Se incluyeron pacientes adultos que recibían tratamiento con quimioterapia intravenosa. Las variables del estudio se obtuvieron a través de un cuestionario y de la historia clínica.

Resultados: Fueron incluidos 316 pacientes; el 32,3% estaba usando algún tipo de medicina complementaria en ese momento, y el 89% de ellos lo hacía a base de una ingesta oral de sustancias, principalmente hierbas y productos naturales. El 81% de los pacientes inició la medicina complementaria tras el diagnóstico, siendo la fuente de información principal familiares/amigos. El 65% refirió sentir mejoría, principalmente bienestar físico y psíquico. Los predictores significativos de uso de MAC fueron: ser mujer ($p=0,028$), edad joven ($p<0,001$) y un nivel educativo medio ($p=0,009$).

Conclusiones: Una proporción importante de los pacientes oncológicos que reciben quimioterapia intravenosa usan simultáneamente medicina complementaria, y esta consiste principalmente en una ingesta oral de preparados. Debido al riesgo de interacción con el tratamiento, es importante la formación de los profesionales sanitarios en este ámbito, con el fin de poder aconsejar a los pacientes acerca de sus potenciales beneficios y riesgos.

- MÁS DE UN 30% DE LOS PACIENTES CON CÁNCER EN TRATAMIENTO CON QT I.V TOMAN ALGÚN TIPO DE TERAPIA COMPLEMENTARIA, PRINCIPALMENTE (89%) HIERBAS Y PRODUCTOS NATURALES.

For Adult Patients / Cancer Care / About Diagnosis & Treatment / Managing Symptoms & Side Effects / Integrative Medicine

Integrative Medicine

Developing Your Personal Care Plan

Therapies, Classes & Workshops

About Herbs, Botanicals & Other Products

Overview

Search About Herbs

About Herbs, Botanicals & Other Products

Stockley's Herbal Medicines Interactions

Edited by Elizabeth Williamson, Samuel Driver and Karen Baxter

WEBINAR III JORNADA ONCOFARMA Actualización en Cáncer de Ovario

INTERACCIÓN QUIMIOTERAPIA INTRAVENOSA CON TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS

- PACLITAXEL:
 - SUSTRATO DE LAS ISOENZIMAS CYP2C8 Y CYP3A4.

- EXTRACTO DE TÉ VERDE
- ALOE VERA
- MUERDAGO

HEPATOTÓXICO
INHIBIDOR DE CYP3A4.

- HONGOS ORIENTALES

Reishi

Escalafón Deutsch English Français Hrvatski 日本語 한국어 Medios de comunicación Datos de

Evidencia fiable. Decisiones informadas. Mejor salud. Buscar.

Nuestra evidencia Acerca de nosotros Unirse a Cochrane Noticias y empleo

Recursos sobre coronavirus (COVID-19)

(hongo Reishi) para el tratamiento del cáncer

Publicado: 5 abril 2016

Autores: Jin X, Ruiz Beguerie J, See D, Chan GCF

Grupo de Revisión principal: Gynaecological, Neuro-oncology and Orphan Cancer Group

Esta revisión identificó y posteriormente incluyó cinco relevantes ensayos

Conclusiones de los autores:

La revisión no halló evidencia suficiente para justificar el uso de *G. lucidum* como un tratamiento de primera línea para el cáncer. Aún no se sabe si el *G. lucidum* ayuda a prolongar la supervivencia del cáncer a largo plazo. Sin embargo, el *G. lucidum* podría administrarse como un complemento alternativo adjunto al tratamiento convencional si se tiene en cuenta su potencial de mejorar la respuesta tumoral y estimular la inmunidad del huésped. El *G. lucidum* generalmente presentó buena tolerabilidad en la mayoría de los participantes y sólo se observó un número disperso de eventos adversos menores. No se observó toxicidad grave entre los estudios. Aunque hubo pocos informes de efectos perjudiciales del *G. lucidum*, el uso de su extracto debe ser juicioso, especialmente después de considerar el coste-beneficio y la preferencia del paciente de forma minuciosa. Los estudios futuros deben enfatizar la mejoría de la calidad metodológica y se necesita investigación clínica adicional sobre el efecto del *G. lucidum* en la supervivencia del cáncer a largo plazo. Esta revisión se actualizará cada dos años.

WEBINAR III JORNADA ONCOFARMA

Actualización en Cáncer de Ovario

2015-----2017

- FINALIZA TRATAMIENTO ADYUVANTE EN NOV 2015
- EN REMISIÓN CON VIGILANCIA ESTRECHA.
- RECAIDA CON CARCINOMATOSIS PERITONEAL.

¿TERAPIA DIRIGIDA? ¿OLAPARIB?

INFORME DE POSICIONAMIENTO TERAPÉUTICO

Informe de Posicionamiento Terapéutico de olaparib (Lynparza®) en cáncer de ovario

IPT, 19/2019, V2

Fecha de publicación: 10 de junio de 2019¹

En 2012, el cáncer de ovario ocupaba el quinto puesto en tumores malignos que afectan a la mujer, siendo la causa más frecuente de

con enfermedad residual tras cirugía o con estadio IV, está aprobado el uso de bevacizumab (11).

A pesar de la alta sensibilidad del cáncer de ovario al tratamiento inicial con platino y taxano (después de la cirugía citoreductora), la mayoría de las mujeres diagnosticadas con enfermedad en estadio avanzado tendrá una recurrencia. Se observa una tasa de recaída del 50% a los 2 años y del 70% a los 4 años (12). De acuerdo al GFIG (Gynecological Cancer InterGroup) la enfermedad recurrente puede clasificarse según su respuesta a platino en platino-refractaria, si la enfermedad progresa durante el tratamiento con quimioterapia basada en platino, platino resistente, si la enfermedad progresa durante los 6 meses posteriores a la finalización del tratamiento, o platino-sensible, si la recurrencia se produce en un periodo mayor a 6 meses tras la última dosis de platino (6). Esta clasificación es pronóstica y

“Olaparib únicamente ha sido financiado en pacientes que cumplan los siguientes criterios:

- Recaída de un cáncer de ovario, trompa de Falopio o primario peritoneal que se haya producido más de 6 meses después de la finalización del penúltimo tratamiento con platino.
- Respuesta al tratamiento con platino realizado para la última recaída.
- Al menos dos tratamientos con platino.
- Mutación en BRCA 1 y/o BRCA 2 (germinal o somática).

La indicación para las pacientes sin mutación BRCA no se encuentra financiada”.

- LÍQUIDO ASCÍTICO POSITIVO PARA ADENOCARCINOMA.
- DETERMINACIÓN BRCA 1-2. **BRCA NEGATIVO**

WEBINAR III JORNADA ONCOFARMA

Actualización en Cáncer de Ovario

MAYO 2019

3ª LÍNEA QT
PALIATIVA

5 CICLOS
PACLITAXEL+CARBOPLATINO+BEVACIZUMAB

- TERAPIA ANTIANGIOGÉNICA EN CA OVARIO:
BEVACIZUMAB 15 MG/KG/21D

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE

ORIGINAL ARTICLE

Incorporation of Bevacizumab in the Primary Treatment of Ovarian Cancer

Robert A. Burger, M.D., Mark F. Brady, Ph.D., Michael A. Bookman, M.D., Gini F. Fleming, M.D., Bradley J. Monk, M.D., Helen Huang, M.S., Robert S. Mannel, M.D., Howard D. Homesley, M.D., Jeffrey Fowler, M.D., Benjamin E. Greer, M.D., Matthew Boente, M.D., Michael J. Birrer, M.D., Ph.D., and Sharon X. Liang, M.D., for the Gynecologic Oncology Group^{†*}

GOG 218 Burger et al. N Engl J Med 2011

WEBINAR III JORNADA ONCOFARMA
Actualización en Cáncer de Ovario

INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA. EFICIENCIA DE DOSIS. ESTUDIO ICON7

BEVACIZUMAB 7,5 MG/KG/21D

The authors' affiliations are listed in the Appendix. Address reprint requests to Dr. Parmar at MRC CTU, Aviation House, 125 Kingsway, London W12B 6NH, United

BACKGROUND

Angiogenesis plays a role in the biology of ovarian cancer. We examined the effect of bevacizumab, the vascular endothelial growth factor inhibitor, on survival in women with this disease.

ICON7 Perren et al. N Engl J Med 2012

ORGANIZA:

WEBINAR III JORNADA ONCOFARMA

Actualización en Cáncer de Ovario

INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA. EFICIENCIA DE DOSIS. ESTUDIO ICON7

Grade ≥ 3 AE, %	GOG-0218		ICON7	
	CP (N=601)	CPB15+ (N=607)	CP (N=763)	CPB7.5+ (N=746)
Hypertension (grade ≥ 2 , both trials)	7.2	22.9	2.1	18.3
● GI perforation/fistula/abscess (grade ≥ 2 for GOG-0218)	1.2	2.6	0.4	1.3
● Proteinuria	0.7	1.6	0.1	0.5
● Wound-healing complication (all grades for GOG-0218)	2.8	3.0	0.4	1.3

¿NUEVA RECAIDA?

- ACTUALMENTE CON BEVACIZUMAB DE MANTENIMIENTO
- VALORAR OPCIONES DE TRATAMIENTO CON INHIBIDORES DE PARP
- ENSAYOS CLÍNICOS DE TRATAMIENTOS CON IPARP EN MONOTERAPIA TRAS MÚLTIPLES LÍNEAS.

¡MUCHAS GRACIAS!

amaria.iglesias@salud.madrid.org

WEBINAR III JORNADA ONCOFARMA
Actualización en Cáncer de Ovario